



GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Liquigel®

2,5 mg/g Augengel
Carbomer 974 P



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Liquigel® jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Haben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Liquigel® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Liquigel® beachten?
3. Wie ist Liquigel® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Liquigel® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LIQUIGEL® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Liquigel® ist ein Augengel, das zur symptomatischen Therapie des trockenen Auges angewendet wird. Das Arzneimittel wird als Ersatz für die natürliche Tränenflüssigkeit angewendet, wenn die Augenoberfläche unzureichend befeuchtet wird oder der Tränenfilm instabil ist. Liquigel® enthält das Polymer Carbomer 974 P.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LIQUIGEL® BEACHTEN?

Liquigel® darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Carbomer 974 P oder einen der sonstigen Bestandteile von Liquigel® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Liquigel® ist erforderlich,

wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Kontaktlinsen müssen vor jeder Anwendung von Liquigel® entfernt werden und dürfen frühestens nach 30 Minuten wieder eingesetzt werden.

Bei Anwendung von Liquigel® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Falls Sie ein weiteres Arzneimittel am Auge anwenden möchten, sollte zwischen der Anwendung der Arzneimittel ein Abstand von mindestens 15 Minuten liegen. Liquigel® sollte zuletzt angewendet werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Erfahrungen über die Anwendung von Liquigel® während der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Liquigel® sollte nur angewendet werden, wenn der Arzt eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Analyse durchgeführt hat.

Anwendung bei Kindern

Es liegen keine Erfahrungen für die Anwendung von Liquigel® bei Kindern vor. Daher wird Liquigel® nicht zur Anwendung bei Kindern empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Unmittelbar nach dem Eintropfen kann Liquigel® kurzzeitiges Schleiensehen verursachen. Sollten Sie davon betroffen sein, dürfen Sie Fahrzeuge und Maschinen erst dann bedienen, wenn Sie wieder klar sehen können.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Liquigel®

Liquigel® enthält das Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kann Reizungen am Auge hervorrufen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit weichen Kontaktlinsen.

Benzalkoniumchlorid kann zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen. Kontaktlinsen müssen Sie vor der Anwendung entfernen und dürfen diese frühestens 30 Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.

3. WIE IST LIQUIGEL® ANZUWENDEN?

Wenden Sie Liquigel® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Liquigel® Augengel wird am Auge angewendet.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

1 Tropfen, den Sie je nach Bedarf 1 – 4 mal täglich in das Auge eintropfen.

Hinweise zur Anwendung

Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn das Schutzlegel am Verschluss vor dem erstmaligen Gebrauch beschädigt ist.

Waschen Sie sich vor dem Öffnen der Flasche die Hände. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und sehen Sie an die Decke.



1.



2.



3.

1. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, bis sich eine kleine Tasche bildet.

2. Drehen Sie die Flasche um und drücken Sie auf die Flasche, bis ein Tropfen in das zu behandelnde Auge fällt.

3. Lassen Sie das Unterlid los und blinzeln Sie einige Male.

Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 am anderen Auge, falls dieses auch behandelt werden muss. Wenn ein Tropfen nicht in das Auge gelangt, versuchen Sie es nochmals.





Berühren Sie mit der Tropfspritze nicht das Auge oder andere Oberflächen, um eine Verunreinigung von Liquegel® zu vermeiden. Verschließen Sie die Flasche nach jeder Anwendung wieder fest und stellen Sie diese zurück in den Umkarton. Damit sich Liquegel® bei der nächsten Anwendung besser tropfen lässt, sollten Sie die Flasche auf dem Kopf stehend aufbewahren.

Liquegel® ist für die Dauertherapie geeignet und sollte nach ärztlicher Anweisung solange angewendet werden, wie es die Beschwerden erfordern.

Falls während der Behandlung mit Liquegel® Reizungen, Schmerzen, Rötungen oder Änderungen im Sehvermögen auftreten oder Sie den Eindruck haben, dass sich Ihr Zustand verschlechtert, sollten Sie die Behandlung beenden und mit Ihrem Arzt oder Apotheker sprechen.

Wenn Sie eine größere Menge von Liquegel® angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viele Tropfen am Auge angewendet haben, ist es unwahrscheinlich, dass dies zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser aus, falls Sie zu viele Tropfen am Auge angewendet haben. Führen Sie die nächste Anwendung zum vorgesehenen Zeitpunkt durch.

Wenn Sie die Anwendung von Liquegel® vergessen haben

Falls Sie eine Anwendung vergessen haben, holen Sie die vergessene Dosis nach sobald Sie sich daran erinnern, es sei denn es ist bereits Zeit für die nächste Dosis. In diesem Fall sollten Sie die vergessene Dosis auslassen. Wenden Sie die nächste Dosis wie gewohnt an und setzen Sie die Behandlung planmäßig fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Liquegel® abbrechen

Sie sollten die Behandlung mit Liquegel® nicht beenden oder die von Ihnen angewendete Menge verringern, bis Ihr Arzt Ihnen dies rät, da sich Ihre Beschwerden sonst verschlimmern könnten.

Liquegel® sollte nach Anweisung Ihres Arztes angewendet werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Liquegel® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es ist bekannt, dass nach Anwendung von Liquegel® folgende Nebenwirkungen am Auge auftreten können, die Anzahl der Behandlungen, bei denen sie aufgetreten sind, ist jedoch nicht bekannt:

- leichtes, vorübergehendes Schleiersehen
- Augenbrennen

Überempfindlichkeitsreaktionen sind sehr selten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST LIQUEGEL® AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Anbruch darf Liquegel® höchstens 4 Wochen lang verwendet werden. Nicht über 25°C lagern und nicht einfrieren. Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Wie im Abschnitt 3. „Wie ist Liquegel® anzuwenden“ erwähnt, sollte die Flasche, wenn sie nicht benutzt wird, auf dem Kopf stehend im Umkarton aufbewahrt werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Liquegel® enthält

Der Wirkstoff ist: Carbomer 974 P 2,5 mg/g

Die sonstigen Bestandteile sind: Benzalkoniumchlorid,

Poly(vinylalkohol), Sorbitol (Ph.Eur.), Natriumacetat-Trihydrat,

Lysin-Monohydrat und Wasser für Injektionszwecke.

Wie Liquegel® aussieht und Inhalt der Packung

Liquegel® ist ein farbloses bis blassgelbes Gel in einer Tropfflasche aus Kunststoff mit einem Schraubverschluss.

Jede Flasche enthält 10 g Augengel.

Packungsgrößen: 1 x 10 g und 3 x 10 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer

Laboratoires THEA 12 rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 FRANKREICH

Hersteller


URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG, Industriestraße,

66129 Saarbrücken

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt in 08/2008.

örtlicher Vertreter: Théa Pharma GmbH Reyerstrasse 10

44379 Dortmund



NB30630LTA-00209

