

Liquid®

Théa

GEBRAUCHSINFORMATION:
INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

2,5 mg/g Augengel
Carbomer 974 P

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bedürftigen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Liquid® jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Haben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebräuchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Liquid® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Liquid® beachten?
3. Wie ist Liquid® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Liquid® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LIQUID® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Liquid® ist ein Augengel, das zur symptomatischen Therapie des trockenen Auges angewendet wird. Das Arzneimittel wird als Ersatz für die natürliche Tränennüssigkeit angewendet, wenn die Augenoberfläche unzureichend beflockt wird oder der Tränenfilm instabil ist. Liquid® enthält das Polymer Carbomer 974 P.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LIQUID® BEACHTEN?

Liquid® darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Carbomer 974 P oder einen der sonstigen Bestandteile von Liquid® sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Liquid® ist erforderlich, wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Kontaktlinsen müssen Sie vor jeder Anwendung von Liquid® entfernen und dürfen diese frühestens 30 Minuten nach der Anwendung wieder einsetzen.

3. WIE IST LIQUID® ANZUWENDEN?

Wenden Sie Liquid® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Liquid® Augengel wird am Auge angewendet. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis 1 Tropfen, den Sie je nach Bedarf 1 – 4 mal täglich in das Auge eintröpfen.

Hinweise zur Anwendung

Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn das Schutzsiegel am Verschluss vor dem erstmaligen Gebrauch beschädigt ist. Waschen Sie sich vor dem Öffnen der Flasche die Hände. Neigen Sie den Kopf leicht nach hinten und seien Sie an die Decke.



1. Ziehen Sie das Unterteil vorsichtig nach unten, bis sich eine kleine Tasche bildet.
2. Drehen Sie die Flasche um und drücken Sie auf die Flasche, bis ein Tropfen in das zu behandelnde Auge fällt.
3. Lassen Sie das Unterteil los und blinzeln Sie einige Male. Wiederholen Sie Schritt 1 bis 3 am anderen Auge, falls dieses auch behandelt werden muss. Wenn ein Tropfen nicht in das Auge gelangt, versuchen Sie es nochmals.





Berühren Sie mit der Tropfenspitze nicht das Auge oder andere Oberflächen, um eine Verunreinigung von Liquigel® zu vermeiden. Verschließen Sie die Flasche nach jeder Anwendung wieder fest und stellen Sie diese zurück in den Umkarton. Damit sich Liquigel® bei der nächsten Anwendung besser tropfen lässt, sollten Sie die Flasche auf dem Kopf stehend aufbewahren.

Liquigel® ist für die Dauertherapie geeignet und sollte nach ärztlicher Anweisung solange angewendet werden, wie es die Beschwerden erfordern.

Falls während der Behandlung mit Liquigel® Reizungen, Schmerzen, Rötungen oder Änderungen im Sehvermögen auftreten oder Sie den Eindruck haben, dass sich Ihr Zustand verschlechtert, sollten Sie die Behandlung beenden und mit Ihrem Arzt oder Apotheker sprechen.

Wenn Sie eine größere Menge von Liquigel® angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie versehentlich zu viele Tropfen am Auge angewendet haben, ist es unwahrscheinlich, dass dies zu unerwünschten Nebenwirkungen führt. Spülen Sie Ihre Augen mit klarem Wasser aus, falls Sie zu viele Tropfen am Auge angewendet haben. Führen Sie die nächste Anwendung zum vorgesehenen Zeitpunkt durch.

Wenn Sie die Anwendung von Liquigel® vergessen haben

Falls Sie eine Anwendung vergessen haben,holen Sie die vergessene Dosis nach sobald Sie sich daran erinnern, es sei denn es ist bereits Zeit für die nächste Dosis. In diesem Fall sollten Sie die vergessene Dosis auslassen. Wenden Sie die nächste Dosis wie gewohnt an und setzen Sie die Behandlung planmäßig fort. Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie die Anwendung von Liquigel® abbrechen

Sie sollten die Behandlung mit Liquigel® nicht beenden oder die von Ihnen angewendete Menge verringern, bis Ihr Arzt Ihnen dies rät, da sich Ihre Beschwerden sonst verschlimmern könnten.

Liquigel® sollte nach Anweisung Ihres Arztes angewendet werden. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Liquigel® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Es ist bekannt, dass nach Anwendung von Liquigel® folgende Nebenwirkungen am Auge auftreten können, die Anzahl der Behandler, bei denen sie aufgetreten sind, ist jedoch nicht bekannt:

- leichtes, vorübergehendes Schleieren
- Augentropfen

Überempfindlichkeitsreaktionen sind sehr selten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST LIQUIGEL® AUFZUBEWAHREN?


Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und dem Umkarton nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Nach Ablauf darf Liquigel® höchstens 4 Wochen lang verwendet werden. Nicht über 25°C lagern und nicht einfrieren. Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen. Wie im Abschnitt 3 „Wie ist Liquigel® anzuwenden“ erwähnt, sollte die Flasche, wenn sie nicht benutzt wird, auf dem Kopf stehend im Umkarton aufbewahrt werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Liquigel® enthält

Der Wirkstoff ist: Carbomer 974 P 2,5 mg/g
Die sonstigen Bestandteile sind: Benzalkoniumchlorid, Polyvinylalkohol, Sorbitol [Ph. Eur.], Natriumacetat-Trihydrat, Lysin-Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.



N890610.TA/0209