VOLKSVERSAND APOTHEKE

Gebrauchsinformation:
Information für Anwender

pantovigar

Hartkapseln

Pantovigar Hartkapseln.
Zur Anwendung bei Erwachsenen.

Wirkstoffe: Thiaminnitrat, Calciumpantothenat, Cystin, Keratin, Saccharomyces cerevisiae-Trockenhefe, inaktiviert.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- *Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.*
- *Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.*
- *Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.*
- *Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.*

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Pantovigar und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pantovigar beachten?
3. Wie ist Pantovigar einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Pantovigar aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Pantovigar und wofür wird es angewendet?

Traditionelles Arzneimittel zur Anwendung bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln.

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Pantovigar beachten?

Pantovigar darf nicht angewendet werden
- wenn Sie allergisch gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Es müssen keine Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Pantovigar einnehmen.

Kinder
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb nicht angewendet werden.

Einnahme von Pantovigar zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.
Es sind bisher keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Pantovigar einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein.
Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt 3 mal 1 Hartkapsel täglich.

Art der Anwendung:
Es hat sich bewährt, Pantovigar zu den Hauptmahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit einzunehmen.

Dauer der Anwendung:
Die mittlere Behandlungsdauer liegt bei 3–6 Monaten. Zur Unbedenklichkeit von Pantovigar bei längerer oder wiederholter

Anwendung liegen keine Untersuchungen vor. Risiken sind nicht bekannt.

Wenn Sie eine größere Menge von Pantovigar eingenommen haben als Sie sollten
Überdosierungserscheinungen sind bis jetzt nicht bekannt.

Wenn Sie die Einnahme von Pantovigar vergessen haben
Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In seltenen Fällen sind Unverträglichkeitsreaktionen wie Tachykardie, erhöhte Herzfrequenz, vermehrtes Schwitzen, Hautreaktionen mit Jucken und Ausschlag (auch nesselartig) sowie Magen-Darm-Beschwerden wie Aufstoßen, Übelkeit, Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall beobachtet worden. Außerdem wurde im Zusammenhang mit der Einnahme von Pantovigar von Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Erbrechen, Herzklopfen und Hautrötung berichtet.

Sollten Nebenwirkungen auftreten, ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt zu befragen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: *mehr als 1 Behandelter von 10*
Häufig: *1 bis 10 Behandelte von 100*
Gelegentlich: *1 bis 10 Behandelte von 1.000*
Selten: *1 bis 10 Behandelte von 10.000*
Sehr selten: *als 1 Behandelter von 10.000*
Nicht bekannt: *Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: http://www.bfarm.de

anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Pantovigar aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis nach „Verwendbar bis" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Nicht über 25°C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Pantovigar enthält
- Die Wirkstoffe sind: 1 Hartkapsel enthält Thiaminnitrat 60,00 mg, Calciumpantothenat 60,00 mg, Cystin 20,00 mg, Keratin 20,00 mg, Saccharomyces cerevisiae-Trockenhefe, inaktiviert 100,00 mg

- Die sonstigen Bestandteile sind: Povidon 30, mikrokristalline Cellulose, Talkum, hochdisperses Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Gelatine, gereinigtes Wasser, Farbstoffe (E132, E171, E172)

Wie Pantovigar aussieht und Inhalt der Packung
Hartkapseln zum Einnehmen
Originalpackung mit 30, 90 und 300 Kapseln

Pharmazeutischer Unternehmer
GEORG SIMONS GmbH
Eckenheimer Landstraße 100,
60318 Frankfurt/Main
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-830

Hersteller
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstraße 100,
60318 Frankfurt/Main
Telefon: 069/1503-1
Telefax: 069/1503-200

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2015.