

# Sanum

## Sanukehl® Trich D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Trichophyton verrucosum e volumine mycelii D6
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Trichophyton verrucosum e volumine mycelii D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	<p>Zum Einnehmen: Bei akuten Zuständen werden von Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden eingenommen. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen.</p> <p>Zum Einreiben in die Haut: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle 1-2 Tage 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeugen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte eine mehrmonatige Therapiepause eingelegt werden.</p>
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Trich D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	<p>Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Trichophytonarten.</p> <p>Nicht anwenden bei Kindern unter 12 Jahren.</p>

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen: Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel oder Therapien können die Wirksamkeit von Sanukehl® Trich D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

---

Handelsform: 10 ml Tropfflasche, 10x 10 ml Bündelpackung.