

Sanum

Strophanthus D4 Sanum Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus Pflanzenextrakten
Wirkstoff:	Strophanthus gratus D4 dil.
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Strophanthus gratus D4 dil.
Indikation:	Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Herzschwäche, Erwartungsangst.
Eigenschaften:	<p>Strophanthin, auch bekannt unter dem Namen Ouabain, wurde von den Ureinwohnern Afrikas schon lange als Pfeilgift benutzt. Es wird aus einer milchsaftproduzierenden Schlingpflanze gewonnen, es ist aber zugleich auch ein körpereigenes Hormon des Menschen, das in der Zona fasciculata der Nebenniere gebildet wird und an der Regulation des Salz- und Wasserhaushaltes beteiligt ist. Im menschlichen Hypothalamus ist ebenfalls g-Strophanthin enthalten. Das g-Strophanthin ist also ein körpereigener Stoff. Durch seinen Einfluss kann in jedem Falle die Herzarbeit wesentlich entlastet werden.</p> <p>Bei einer Schwäche der Nebenniere, mit der in zunehmendem Alter gerechnet werden muss, können Gaben von g-Strophanthin die fehlende Funktion der Nebenniere auffangen und damit das schwache "Altersherz" stützen.</p>
Anwendung:	Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6x täglich, je 5 Tropfen ein. Bei chronischen Verlaufsformen 1-3x täglich je 5 Tropfen einnehmen. Die Tropfen sollen vor den Mahlzeiten

eingenommen werden.

Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
-----------------	----------------

Gegenanzeigen:	<p>Strophanthus D4 Sanum Flüssige Verdünnung darf nicht angewendet werden bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahre sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht anwenden bei bestehender Niereninsuffizienz.</p> <p>Wegen des Alkoholgehaltes soll Strophanthus D4 Sanum Flüssige Verdünnung bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.</p>
----------------	--

Unerwünschte Reaktionen:	
--------------------------	--

Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
-------------------	----------------

Vorsichtsmaßnahmen:	<p>Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzschwäche sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht die Einnahme anderer vom Arzt verordneter Arzneimittel.</p> <p>Bei Einnahme weiterer herzwirksamer Glykoside (z.B. Digoxin, Digitoxin) sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden.</p>
---------------------	---

Hinweis:	
----------	--

Warnhinweis:	<p>Enthält 51 Vol.-% Alkohol.</p> <p>Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 0,3 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,15 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirnge schädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.</p>
--------------	--

Dauer der Behandlung:	
-----------------------	--

Handelsform:	10/30/100 Tropfflasche.
--------------	-------------------------