

Mundgel aldiamed

Speichelerganzung



angenehme Frische - statt trockener Mund

 Bitte Gebrauchsinformation aufmerksam lesen

Anwendungsgebiet:

aldiamed Mundgel ist ein lang anhaltendes Feuchtigkeitsgel zur Behandlung bei Mundtrockenheit (Xerostomia).

Wirkweise:

aldiamed Mundgel verleiht eine fur Stunden andauernde, **angenehme Befeuchtung** im Mund. Es **beugt Entzundungen im Mundraum vor**.

Die angenehm dickflussige Konsistenz sorgt dafur, dass sich das Mundgel lang anhaltend wie ein Schutzfilm auf die Mundschleimhaut legt und diese **auch nachts sehr gut vor dem Austrocknen schutzt**.

Ursachen der Mundtrockenheit:

Die Intensitat der Speichelproduktion ist von Mensch zu Mensch verschieden ausgepragt und nimmt mit zunehmendem Alter meist ab.

Sie ist Schwankungen unterworfen, die z. B. auf einen starken Flussigkeitsmangel zuruckzufuhren sind (ungenugendes Trinken). Zudem kann der Speichel durch Erkrankungen wie Diabetes Mellitus oder Sjogren-Syndrom, Strahlentherapien, Medikamentennebenwirkungen, verminderte Kau- und Sprechtatigkeit, Stress, psychische Probleme, Rauchen sowie

Mundatmung (bei Erkaltung oder Schnarchen) verringert sein.

Die Rolle des Speichels:

Der Speichel des Menschen ist der naturliche Schutz der Zahne und des Zahnfleisches. Er enthalt verschiedene Enzyme, die im Mundraum gegen Mikroorganismen wirken.

Ein trockener Mund kann sehr unangenehm sein und erschwert das Sprechen, Kauen und Schlucken. Zudem konnen aufgrund des verminderten Speichels bakteriell verursachte Entzundungen, Zahnprobleme (z. B. Karies, Parodontose) und Infektionen entstehen. Speichelmangel ist eine der Hauptursachen fur die erhohnte Bildung von Plaque, Mundgeruch und Zahnfleischentzundungen.

Deshalb enthalt aldiamed Mundgel den Speichelbestandteil Lactoferrin (Enzym), welcher hilft, schadliche Bakterien zu bekampfen.

Anwendung:

- so oft wie erforderlich
- nach dem Zahneputzen
- nach dem Mundspulen, z. B. mit der aldiamed Mundspulung
- und ganz besonders abends vor dem Zubettgehen

Sie können aIdiamed Mundgel mit einem sauberen Finger oder einem Wattestäbchen unmittelbar auf das Zahnfleisch oder die besonders trockenen Bereiche im Mund auftragen.

Um Ihre Mundhöhle komplett zu benetzen, können Sie auch 1 - 2 cm aIdiamed Mundgel auf die Zunge legen und gleichmäßig mit der Zunge im Mundraum verteilen.

Hinweise:

Der Zeitraum der Befeuchtung hängt von subjektiven Faktoren ab. Geringer Restspeichelfluss kann genau wie Essen, Trinken, Kaugummi kauen oder Zähneputzen das Gel schneller aus dem Mund spülen. Für eine langanhaltende Wirkung empfehlen wir, das Gel nach dem Essen und Trinken aufzutragen.

aIdiamed Mundgel ist auch für Diabetiker und für Träger von Zahnprothesen geeignet.

Wirkstoffe: Glycerin, Sorbitol, Xylitol, Aloe Vera, Polyacrylat, Xanthan, Lactoferrin.

Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nicht auf versehrter Mundschleimhaut anwenden.

Neben-/Wechselwirkungen: Bei Überdosierung (mehr als eine Tube täglich) ist eine abführende Wirkung möglich.

Weitere aIdiamed-Produkte:

Insbesondere bei trockenem Mund ist eine gute Mundhygiene äußerst wichtig. Dazu gehört auch die regelmäßige Anwendung einer Mundspülung. Bei trockenem Mund sollte diese keine


reizenden Inhaltsstoffe wie Alkohol oder Menthol enthalten.

aIdiamed Mundspülung erfüllt diese Vorgaben. Sie reinigt, pflegt und schützt Zähne und Mundschleimhaut sehr gut. Dank der leicht dickflüssigen Konsistenz befeuchtet sie den Mund angenehm.


Zur Befeuchtung und Pflege des trockenen Mundes für unterwegs und zwischendurch empfehlen wir **aIdiamed Mundspray**.

Packungsgrößen aIdiamed-Produkte:

Mundgel: 50 g / 40 ml
 PZN (D): 00879268
 PZN (AT): 3888517



Mundspülung: 250 ml
 PZN (D): 00879239
 PZN (AT): 3888523



Mundspray: 50 ml
 PZN (D): 09397022
 PZN (AT): 3887021




 Certmedica International GmbH
 Magnolienweg 17, D-63741 Aschaffenburg

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Tel.: +49 60 21 / 15 09 3 - 380

www.aIdiamed.de

Stand der Information: 2014-09

 Verfallsdatum beachten

 Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate