




AMFLEE® combo **tötet adulte Flöhe innerhalb von 24 Stunden** nach dem Befall Ihres Haustieres. Dank seiner **speziellen Formel** mit dem IGR (Insect Growth Regulator) (S)-Methopren, **hemmt es auch die Entwicklung von Floh-Eiern, Larven und Puppen**. Diese **doppelte Wirkung** ermöglicht einen **effizienten Schutz** gegen neuen Flohbefall Ihres Haustieres.



Darüber hinaus ist AMFLEE® combo **auch gegen Zecken und Haarlinge wirksam**. Unter den äußeren Parasiten von Hunden und Katzen gehören **Zecken** zu den schädlichsten, da sie **zahlreiche Krankheiten übertragen können**.

## Die Behandlung

### 1. Behandlung Ihres Haustieres

Helfen Sie Ihrem Haustier, den Flohlebenszyklus mit einer **Flohbehandlung** zu durchbrechen. Denken Sie daran, dass adulte Flöhe nur 5% der gesamten Flohpopulation ausmachen. **AMFLEE® combo** hat eine **doppelte Wirkung**: Es wirkt sowohl gegen adulte Flöhe auf dem Tier, als auch gegen Flöhe in unterschiedlichen Entwicklungsstadien in der Umgebung. Behandeln Sie **alle Haustiere** im Haushalt gleichzeitig.

### Auch gegen Zecken und Haarlinge!

**AMFLEE® combo wirkt direkt bei Kontakt**. Die Zecke stirbt kurz nach dem Kontakt mit dem Arzneimittel, wodurch das Risiko einer Infektion und Übertragung von Krankheiten verringert wird.

### 2. Behandlung des Zuhauses

Es ist wichtig, nicht nur das befallene Haustier zu behandeln, sondern auch Ihr Zuhause. Waschen Sie die Decken Ihres Haustieres regelmäßig bei 60 °C. Saugen Sie Ihre Böden und

Möbel wiederholt ab, um Eier, Larven und Puppen zu entfernen, und entsorgen Sie den Staubsaugerbeutel.

#### **MERKE!**


**Um einen Befall erfolgreich auszurotten, muss MINDESTENS 3 MONATE lang eine wirksame Kontrolle aufrechterhalten werden.** Durch die Anwendung über diesen Zeitraum wird die Umgebung von Flöhen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die etwa 95% der gesamten Flohpopulation ausmachen, befreit.

**Die AMFLEE® combo Pipette ist besonders anwenderfreundlich.**

Aufgrund ihrer einfachen und stressfreien Anwendung erhielt die AMFLEE® combo Pipette eine [internationale Auszeichnung von der »International Cat Care Society«](#).

#### **Die AMFLEE® combo Pipette:**

- Ist **leicht zu öffnen**, da **keine Schere** erforderlich ist;
- kann **nach dem Öffnen wieder geschlossen werden**, falls das Haustier sich sträubt oder flüchtet. So kann eine **stressfreie** Anwendung für das Tier zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden;
- hat **glatte Kanten**, sodass **keine Gefahr** besteht, das Haustier zu verletzen;
- die Spitze der Pipette ist so gestaltet, dass Auslaufen minimiert wird;
- ist **weich** und kann dadurch leicht zusammengedrückt werden;
- ist in einem Pipettenbeutel verpackt, der eine **einfache Aufbewahrung** ermöglicht.



**AMFLEE® combo ist sicher.**

- Amflee® combo **ist kein systemisches Arzneimittel**, es verteilt sich nicht im Blutkreislauf, sondern verbleibt auf der Hautoberfläche der Haustiere.
- Für Fipronil gibt es positive klinische Erfahrungen über **mehr als 30 Jahre**.
- Kann bereits **ab einem Alter von 8 Wochen** angewendet werden.
- Kann **während der Trächtigkeit und Säugezeit** bei Hunden und während der Trächtigkeit bei Katzen angewendet werden.

## ANWENDUNGS-GUIDE

Wählen Sie eine Pipettengröße, die für Ihr Haustier und dessen Gewicht passt.

Katzen	Hunde 2–10 kg	Hunde 10–20 kg	Hunde 20–40 kg	Hunde + 40 kg
50mg/60mg	67mg/60.3mg	134mg/120.6mg	268mg/241.2mg	402mg/361.8mg
				

## PFLICHTANGABEN

### AMFLEE® combo 50 mg/60 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

Wirkstoff(e): Fipronil, (S)-Methopren

**Zusammensetzung:** Jede 0,5 ml Pipette enthält: Wirkstoffe: Fipronil: 50 mg, (S)-Methopren: 60 mg. Sonstige Bestandteile: Butylhydroxyanisol (E320): 0,10 mg, Butylhydroxytoluol (E321): 0,05 mg, Povidon (K25), Polysorbat 80, Ethanol 96%, Diethylenglycolmonoethylether. **Anw.:** Gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken und/oder Haarlingen: 1. Abtötung von Flöhen (*Ctenocephalides* spp.). Die insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen bleibt 4 Wochen lang erhalten. Die Vermehrung der Flöhe wird durch Entwicklungshemmung der Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung), die von den gelegten Eiern erwachsener Flöhe stammen, für 6 Wochen nach der Behandlung verhindert. 2. Abtötung von Zecken (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Das Tierarzneimittel hat eine bis zu 2 Wochen anhaltende akarizide Wirksamkeit gegen Zecken (basierend auf experimentellen Daten). 3. Abtötung von Haarlingen (*Felicola subrostratus*). **Gegenanz.:** Nicht anwenden bei Katzenwelpen, die jünger als 8 Wochen sind und/oder weniger als 1 kg wiegen, da hierfür keine Untersuchungen vorliegen. Nicht bei kranken (z. B. systemische Krankheiten, Fieber) oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Nicht anwenden, wenn Ihre Katze eine Überempfindlichkeit gegenüber Fipronil oder (S)-Methopren oder einem der sonstigen Bestandteile hat. **Nicht bei Kaninchen anwenden, da es zu Unverträglichkeiten, auch mit Todesfolge, kommen kann.** Nicht bei anderen Tierarten anwenden. **Nebenw.:** Zu den sehr seltenen Nebenwirkungen nach der Anwendung gehören vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Schuppen, lokaler Haarausfall, Juckreiz, Hautrötung) und allgemeiner Juckreiz oder Haarausfall. Vermehrter Speichelfluss, reversible neurologische Symptome (Hyperästhesie, Depression, andere nervöse Symptome) oder Erbrechen wurden ebenfalls nach Anwendung beobachtet. Nach Ablecken der Anwendungsstelle kann vorübergehend vermehrtes Speicheln auftreten, hauptsächlich verursacht durch die Trägerstoffe. Nicht überdosieren. **Trächtigkeit, Laktation:** Kann während der Trächtigkeit angewendet werden. (Für die Behandlung während der Stillzeit. s. Fachinformation.

**Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven.

Stand Januar 2021

**AMFLEE® combo 67 mg/60,3 mg Lösung zum Auftropfen für kleine Hunde/ AMFLEE® combo 134 mg/120,6 mg Lösung zum Auftropfen für mittelgroße Hunde/ AMFLEE® combo 268 mg/241,2 mg Lösung zum Auftropfen für große Hunde/ AMFLEE® combo 402 mg/361,8 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde**

Wirkstoffe: Fipronil, (S)-Methopren

**Zusammensetzung:** Jede Pipette (0,67 ml/1,34 ml/2,68 ml/4,02 ml) enthält: Wirkstoffe: Fipronil: 67 mg/134 mg/268 mg/402 mg, (S)-Methopren: 60,3 mg/120,6 mg/241,2 mg/361,8 mg. Sonstige Bestandteile: Butylhydroxyanisol (E320): 0,134 mg/0,27 mg/0,54 mg/0,80 mg, Butylhydroxytoluol (E321): 0,067 mg/0,13 mg/0,27 mg/0,40 mg, Povidon (K25), Polysorbat 80, Ethanol 96%, Diethylenglycolmonoethylether. **Anw.:** Gegen Flohbefall, allein oder in Verbindung mit Zecken und/oder Haarlingen. Behandlung von Flohbefall (*Ctenocephalides* spp.). Die insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen bleibt 8 Wochen lang erhalten. Die Vermehrung der Flöhe wird durch Entwicklungshemmung der Eier (ovizide Wirkung) sowie der Larven und Puppen (larvizide Wirkung), die von den gelegten Eiern erwachsener Flöhe stammen, für 8 Wochen nach der Behandlung verhindert. Behandlung von Zeckenbefall (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Das Tierarzneimittel hat eine bis zu 4 Wochen anhaltende akarizide Wirksamkeit gegen Zecken. Behandlung von Haarlingsbefall (*Trichodectes canis*). **Gegenanz.:** Nicht anwenden bei Hundewelpen, die jünger als 8 Wochen sind und/oder weniger als 2 kg wiegen, da hierfür keine Untersuchungen vorliegen. Nicht bei kranken (z. B. systemische Krankheiten, Fieber) oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Nicht anwenden, wenn Ihr Hund eine Überempfindlichkeit gegenüber Fipronil oder (S)-Methopren oder einem der sonstigen Bestandteile hat. Nicht auf Wunden oder beschädigter Haut anwenden. Nicht bei Katzen und Frettchen anwenden, da dies zu Überdosierungen führen kann. **Nicht bei Kaninchen anwenden, da es zu Unverträglichkeiten, auch mit Todesfolge, kommen kann.** Nicht bei anderen Tierarten anwenden. **Nebenw.:** Zu den äußerst seltenen Nebenwirkungen nach der Anwendung gehören vorübergehende Hautreaktionen an der Applikationsstelle (Farbveränderungen der Haut, lokaler Haarausfall, Juckreiz, Hautrötung) und allgemeiner Juckreiz oder Haarausfall. Vermehrter Speichelfluss, reversible neurologische Symptome (Hyperästhesie, Depression, andere nervöse Symptome), Erbrechen oder respiratorische Symptome wurden ebenfalls nach Anwendung beobachtet. Nach Ablecken der Anwendungsstelle kann vorübergehend vermehrtes Speicheln auftreten, hauptsächlich verursacht durch die Trägerstoffe. Nicht überdosieren. **Trächtigkeit, Laktation:** Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden. **Apothekenpflichtig. Pharmazeutischer Unternehmer:** TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven.

Stand Januar 2021