

# Diarrhøesan® Saft



## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

### Diarrhøesan® Saft – Wirkstoffe: Apfelpektin, Fluidextrakt aus Kamillenblüten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie oder Ihr Kind sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Diarrhøesan® Saft und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Diarrhøesan® Saft beachten?
3. Wie ist Diarrhøesan® Saft einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Diarrhøesan® Saft aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### 1. Was ist Diarrhøesan® Saft und wofür wird er angewendet?

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei unspezifischen Durchfallerkrankungen.

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Wenn Sie oder Ihr Kind sich nach 2 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

#### 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Diarrhøesan® Saft beachten?

Diarrhøesan® Saft darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch gegen Apfelpektin oder Kamillenblüten oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Apotheker bevor Sie Diarrhøesan® Saft einnehmen.

Auf ausreichenden Flüssigkeitsersatz ist zu achten.

Chronische Durchfälle können Symptome ernster Erkrankungen sein, sodass bei länger andauernden Beschwerden immer eine Abklärung der Ursache durch den Arzt erforderlich ist. Wiederholte Durchfälle können, insbesondere bei Kindern, kreislaufunlabilen oder älteren Personen zu gelegentlichen lebensbedrohlichen Wasser- und Elektrolytverlusten führen, sodass auf einen Flüssigkeits- und Elektrolytersatz zu achten ist.

#### Kinder

Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten kann nicht empfohlen werden, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Die Anwendung bei Kindern von 6 Monaten bis 2 Jahren darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, um durchfallbedingte lebensbedrohliche Wasser- und Elektrolytverluste auszuschließen.

#### Einnahme von Diarrhøesan® Saft zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben, oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen. Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

#### Einnahme von Diarrhøesan® Saft zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Auf ausreichenden Flüssigkeitsersatz ist zu achten.

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: Die Wirkung kann noch verbessert werden bzw. schneller eintreten, wenn während der Einnahme von Diarrhøesan® Saft möglichst auf jede Kost verzichtet wird.

Kinder ab 6 Monaten bis 6 Jahren:

Diarrhøesan® Saft kann auch in Getränken, Suppe oder Brei verabreicht werden. Eine Abänderung der Kost ist in vielen Fällen nicht erforderlich.

#### Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bisher gibt es keine Anhaltspunkte für Risiken bei der Anwendung von Diarrhøesan® Saft in der Schwangerschaft und Stillzeit. Ergebnisse von Untersuchungen zur Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit liegen aber nicht vor. Bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Diarrhøesan® Saft hat keinen oder vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### Diarrhøesan® Saft enthält Aspartam

als Quelle für Phenylalanin und kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

#### Diarrhøesan® Saft enthält 1,5 Vol.-% Alkohol.

Das sind bis zu 0,35 g pro 30 ml (maximale Einzeldosis für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren), entsprechend 9 ml Bier oder 4 ml Wein. Ein gesundheitliches Risiko besteht für Patienten, die unter Alkoholismus leiden.

Bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko aufgrund einer Lebererkrankung oder Epilepsie ist dieses zu berücksichtigen.

#### 3. Wie ist Diarrhøesan® Saft einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

	Anfangsdosierung	Anschließende Dosierung	Tageshöchst-dosis
Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren	30 ml	1–6 × 15 ml	120 ml
Kinder ab 4 Jahren	20 ml	1–6 × 10 ml	80 ml
Kinder ab 1 Jahr	15 ml	1–6 × 7,5 ml	60 ml
Kinder ab 6 Monaten	10 ml	1–6 × 5 ml	40 ml

Bitte wenden!

# Diarrhœsan® Saft



Die Anwendung bei Kindern unter 6 Monaten kann nicht empfohlen werden, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Die Anwendung bei Kindern von 6 Monaten bis 2 Jahren darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen, um durchfallbedingte lebensbedrohliche Wasser- und Elektrolytverluste auszuschließen.

Zur Abmessung der angegebenen Dosierungen enthält jede Packung einen skalierten Messbecher. Zum Einnehmen. Vor Gebrauch schütteln!

Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren: Die Wirkung kann noch verbessert werden bzw. schneller eintreten, wenn während der Einnahme von Diarrhœsan® Saft möglichst auf jede Kost verzichtet wird.

Kinder ab 6 Monaten bis 6 Jahren: Diarrhœsan® Saft kann auch mit Getränken, Suppe oder Brei verabreicht werden. Eine Abänderung der Kost ist in vielen Fällen nicht erforderlich.

Auf ausreichenden Flüssigkeitsersatz ist zu achten.

#### Wenn Sie eine größere Menge von Diarrhœsan® Saft eingenommen haben, als Sie sollten

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

#### Wenn Sie die Einnahme von Diarrhœsan® Saft vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen im Mundbereich und an der Haut wurden berichtet.

Angaben zur Häufigkeit des Auftretens von Nebenwirkungen können nicht gemacht werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen  
Inst. Pharmakovigilanz  
Traisengasse 5  
AT-1200 WIEN  
Fax: + 43 (0) 50 555 36207  
Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zu Verfügung gestellt werden.

## 5. Wie ist Diarrhœsan® Saft aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Flasche nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nach dem ersten Öffnen ist dieses Arzneimittel 1 Jahr haltbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

## 6. Inhalt der Verpackung und weitere Informationen

Was Diarrhœsan® Saft enthält

- Die Wirkstoffe pro 100 g (=100 ml) sind: 3,20 g Apfelpektin, 2,50 g Fluidextrakt aus Kamillenblüten (*Matricariae flos*), Droge-Extrakt-Verhältnis 1:1, Auszugsmittel: Ethanol 55% (V/V)
- Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumbenzoat, Saccharin-Natrium, Bananenaroma, Aspartam, gereinigtes Wasser, Alkohol 1.5% (V/V)

#### Wie Diarrhœsan® Saft aussieht und Inhalt der Packung

Hellbrauner bis brauner, dickflüssiger trüber Saft/ Lösung zum Einnehmen, Braunglasflasche mit 200 ml Inhalt.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dr. Loges + Co. GmbH  
Schützenstraße 5  
21423 Winsen (Luhe)  
Deutschland

Reg. Nr.: HERB-00159

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im August 2015.

#### Serviceangebot:

Ausführliche Informationen zu Diarrhœsan® Saft finden Sie auch im Internet unter [www.loges.de](http://www.loges.de).