



# Magen-Gel

gegen Sodbrennen  
+ bei Reflux

Antireflux-Suspension zum Einnehmen  
in 10 ml-Dosierbeuteln



### Zusammensetzung:

Gereinigtes Wasser, Natriumalginat, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Kalziumcarbonat, Aroma, Polyacrylsäure, Natriumpropyl-p-hydroxybenzoat, Natriummethyl-p-hydroxybenzoat, Natriumsacharin.

### Anwendungsgebiete:

Behandlung von gastro-ösophagealer Refluxkrankheit zur Minderung der mit ihr verbundenen Symptome, wie Sodbrennen, Sodbrennen in der Schwangerschaft, Refluxösophagitis, saurem Aufstoßen, Verdauungsbeschwerden, Husten und Kehlkopf-Rachen-Entzündung.

### Wirkmechanismus:

Das Produkt basiert auf Natriumalginat und Carbonaten und einem physikalischen Wirkmechanismus. Sobald es mit den sauren pH-Verhältnissen im Magen in Kontakt kommt, bildet Natriumalginat (ein natürliches Polymer, das aus Braunalgen gewonnen wird) ein Gel. Gleichzeitig setzen die Carbonate Kohlendioxid frei, welches ermöglicht, dass das Gel schwimmt und eine Schutzschicht gebildet wird, die als physikalische Barriere den Rückfluss des Magensafts in der Speiseröhre verhindert.

Außerdem sorgt Natriumbicarbonat dafür, dass die Magensäure reduziert wird.

### Gebrauchshinweise:

Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren: 1 bis 2 Dosierbeutel nach den Hauptmahlzeiten und zur Schlafenszeit einnehmen. Vor Gebrauch gut schütteln.

Kinder unter 12 Jahren: Nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Bitte befolgen Sie die ärztlichen Anweisungen zu den Anwendungsmodalitäten sorgfältig.

### ⚠ Warnhinweise:

- Bitte aus der Reichweite und dem Sichtbereich von Kindern fernhalten.
- Nicht bei schwerem Nierenversagen anwenden.

- Das Produkt nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile.
- Setzen Sie das Produkt bei Nebenwirkungen ab und fragen Sie Ihren Arzt.
- Das Produkt kann Wechselwirkungen mit der Aufnahme oraler Arzneimittel aufweisen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie solche Arzneimittel einnehmen. In jedem Fall sollte ein Zeitintervall von 2 Stunden zwischen der Einnahme des Produktes und anderer Arzneimittel berücksichtigt werden.
- Sollten sich die Beschwerden nach 7 Behandlungstagen nicht bessern, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.
- Das Produkt kann Blähungen verursachen. Die vorgabengetreue Anwendung des Produktes kann die Wahrscheinlichkeit des Auftretens reduzieren.
- Dieses Produkt enthält geringe Mengen an Natrium 98,23 mg (4.27 mmol) und Calcium 32 mg (0.8 mmol) per Beutel (10 ml).

Bitte suchen Sie Ihren Arzt auf, wenn Sie einer salzreduzierten Ernährung bedürfen, d. h. wenn sie unter einem Fall von Bluthochdruck, einer Herz-, Nieren- oder Leberinsuffizienz oder unter einer Hyperkalzämie, Nephrokalzinose oder wiederkehrenden kalziumhaltigen Nierensteinen leiden.


- In der Schwangerschaft und Stillzeit wenden Sie sich bitte vor der Anwendung an Ihren Arzt.

### Lagerung:

Verwenden Sie dieses Produkt nicht nach dem auf der Verpackung und den Beuteln aufgedruckten Verfalldatum.

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 8 °C und 25 °C, fern von Licht und Wärme. Nicht im Kühlschrank aufbewahren.

### Hersteller:

 Biofarma Spa - Via Castelliere  
2 - Mereto di Tomba (UD),  
Italien

### Vertrieb:

  
**Queisser**  
PHARMA  
GmbH & Co. KG  
Schleswiger Str. 74  
24941 Flensburg

MEDIZINPRODUKT **CE0373**

Das Produkt ist erhältlich in Packungen mit 20 x 10 ml-Dosierbeuteln.

Stand der Information: Mai 2016

