

Fisiocrem Spray Active Ice:
Zur Behandlung von Gelenk- und Muskelschmerzen

Fisiocrem Spray Active Ice lindert Schmerzen bei Gelenk- und Muskelverletzungen wie Prellungen, Zerrungen, Verrenkungen, Verstauchungen, Blutergüssen, Traumata, Muskelkrämpfen, verspanntem Nacken oder bei Rücken- oder Nackenschmerzen. **ANWENDUNG:** Mit kreisförmigen Bewegungen 2 bis 5 Sekunden lang aus 20 cm Entfernung auf die unversehrte Haut aufsprühen. Kein Einmassieren erforderlich. Bei Bedarf kann die Anwendung nach Abklingen der Wirkung wiederholt werden. Zur Anwendung das Produkt senkrecht oder mit dem Sprühkopf nach unten halten. **WARNHINWEISE:** Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt sofort mit Wasser ausspülen. Nicht weiter verwenden, wenn Reizungen auftreten. Nicht auf offene Wunden, Schleimhäute sowie Schürf- oder Kratzwunden auftragen. Nicht inhalieren oder in die Augen reiben. Nicht über einen längeren Zeitraum anwenden. Äußerliche Anwendung, nicht einnehmen. Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist. Behälter nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Nach dem Verfalldatum nicht weiter verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile vorliegt. Für Erwachsene und Kinder über 12 Jahren. Vor der Anwendung in der Schwangerschaft oder Stillzeit ärztlichen Rat einholen. **ACHTUNG:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. Unzugänglich für Kinder aufbewahren. Ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.

OUVRIR ICI / APRIRE QUI



***Fisiocrem Spray Active Ice est la solution efficace,
indiquée pour le traitement des douleurs
articulaires et musculaires***

Fisiocrem Spray Active Ice soulage la douleur des blessures articulaires et musculaires dues à des contusions, foulures, luxations, entorses, coups, traumatismes, crampes, torticolis, douleurs dorsales ou cervicales. **MODE D'EMPLOI** : Appliquer à 20 cm de la peau propre entre 2 et 5 secondes, en vaporisant par des mouvements circulaires, il n'est pas nécessaire de masser. Appliquer aussi souvent que nécessaire après que l'effet de l'application précédente a disparu. Le récipient peut être utilisé en position verticale ou à l'envers. **AVERTISSEMENTS** : Éviter le contact avec les yeux ou les muqueuses, en cas de contact laver immédiatement à l'eau. Cesser l'utilisation en cas d'irritation. Ne pas appliquer sur les plaies ouvertes, les muqueuses, les écorchures ou les éraflures. Ne pas inhaler ni vaporiser dans les yeux. Éviter les longues périodes d'application. Usage externe, ne pas ingérer. Ne pas utiliser si le récipient est ouvert ou endommagé. Fermer le récipient soigneusement après son utilisation. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux composants. Pour adultes et enfants de plus de 12 ans. Consulter un médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. **DANGER** : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : Peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir éloigné de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes ouvertes et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer ni brûler, y compris après utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas l'utiliser à des fins autres que celles spécifiées.

Fisiocrem Spray Active Ice è una soluzione efficace indicata per il trattamento dei dolori articolari e muscolari.

Fisiocrem Spray Active Ice allevia il dolore delle lesioni articolari e muscolari causate da contusioni, strappi, slogature, distorsioni, ematomi, traumi, crampi, torcicollo, mal di schiena o infiammazioni cervicali. **MODALITÀ D'USO:** Applicare a 20 cm, su pelle intatta per 2–5 secondi, vaporizzando con movimenti circolari, non è necessario massaggiare. Ripetere l'operazione all'occorrenza, soltanto dopo che l'effetto della prima applicazione sia terminato. Il flacone può essere utilizzato in posizione verticale o capovolto. **AVVERTENZE:** Evitare il contatto con gli occhi e le mucose, in caso di contatto lavare immediatamente con acqua. In caso di irritazione sospendere l'uso. Non applicare su ferite aperte, mucose, abrasioni o escoriazioni. Non inalare e non strofinare sugli occhi. Evitare lunghi periodi di erogazione. Non ingerire. Non utilizzare se il flacone aperto o danneggiato. Richiudere accuratamente il flacone dopo l'uso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti. Per uso esterno. Per adulti e bambini sopra i 12 anni. Consultare il proprio medico in caso di gravidanza o allattamento. **PERICOLO:** Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non fare uso diverso da quello previsto.