

Sanum

Fortakehl® D3 Zäpfchen



Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) D3
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: 0,2 g Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) D3 trit. (HAB, Vorschrift 6). Sonstige Bestandteile: Hartfett.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1x täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Fortakehl® D3 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Fortakehl® D3 an spezifischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium roquefortii ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei -&- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium roquefortii). -&- Kindern unter 12 Jahren -&- Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	

Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Fortakehl® D3 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Hinweis:	Enthält Lactose.
Zusatzhinweis:	Penicillium roquefortii ist als Wirkstoff auch in Exmykehl® enthalten.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 10 Zäpfchen, Bündelpackung mit 10x 10 Zäpfchen.
Stand vom:	008