



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (06251) 1097-0 · Fax (06251) 3342  
<http://www.reckeweg.de>

## Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

*Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.*

*Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Hypotonie-Gastreu® R 44 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.*

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Hypotonie-Gastreu® R 44 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hypotonie-Gastreu® R 44 beachten?
3. Wie ist Hypotonie-Gastreu® R 44 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hypotonie-Gastreu® R 44 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## Hypotonie-Gastreu® R 44

Mischung zum Einnehmen

### 1. WAS IST HYPOTONIE-GASTREU® R 44 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Hypotonie-Gastreu® R 44 ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Herz-Kreislauf-Störungen, insbesondere die Neigung zu niedrigem Blutdruck bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.**

**Hinweis:** Bei allen unklaren und plötzlich einsetzenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HYPOTONIE-GASTREU® R 44 BEACHTEN?

Bisher sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hypotonie-Gastreu® R 44 ist erforderlich:**

#### - bei Kindern:

Die Anwendung des Arzneimittels ist auf Kinder über 12 Jahre und auf Erwachsene beschränkt.

#### - in Schwangerschaft und Stillzeit:

In der Schwangerschaft und Stillzeit darf Hypotonie-Gastreu® R 44 nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Bei Anwendung von Hypotonie-Gastreu® R 44 mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Bei Anwendung von Hypotonie-Gastreu® R 44 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Hypotonie-Gastreu® R 44:

Dieses Arzneimittel enthält 39 Vol.-% Alkohol.



### 3. WIE IST HYPOTONIE-GASTREU® R 44 ANZUWENDEN?

Nehmen Sie Hypotonie-Gastreu® R 44 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

#### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Hypotonie-Gastreu® R 44 angewendet haben, als Sie sollten:**

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes dieses Arzneimittels werden bis zu 6,75 g (22 ml) bzw. 15,41 g (50 ml) Alkohol aufgenommen. Dies kann insbesondere bei Kindern zu Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit oder Müdigkeit führen. In diesem Fall sollte Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher sind für Hypotonie-Gastreu® R 44 keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

#### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de), anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### 5. WIE IST HYPOTONIE-GASTREU® R 44 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

#### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

### 6. WEITERE INFORMATIONEN

#### **Das Arzneimittel Hypotonie-Gastreu® R 44 enthält:**

10 ml enthalten: Wirkstoffe: Crataegus Dil. D1, Laurocerasus Dil. D3, Oleander Dil. D3, Spartium scoparium Dil. D2 je 1 ml. Die Wirkstoffe 2 bis 4 werden über die letzte Stufe gemäß HAB, Vorschrift 40a, gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 30% (m/m).

1 ml entspricht 21 Tropfen

#### **Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Mischung zum Einnehmen in Flaschen mit 22 ml und 50 ml.

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2013.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277256.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.

