

IMMUN LUTSCHTABLETTE

ZINK + VITAMIN C

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink und Vitamin C.
Mit Süßungsmittel – ohne Zuckerzusatz.

60 Tabletten | 60 Tagesportionen (90g)

Allgemeine Hinweise zu dieser Packungsbeilage

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Präparats beginnen: Diese enthält für Sie wichtige Informationen, die Sie auch eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nochmals benötigen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie Informationen oder einen Rat benötigen, die nicht durch die hier beschriebenen Informationen geklärt werden können.

1. Für wen werden die MEDIBOND Immun Lutschtabletten empfohlen?

MEDIBOND Immun Lutschtabletten sind wohlschmeckende Lutschtabletten, die Ihren Körper mit dem Spurenelement Zink und Vitamin C zusätzlich versorgen. Wir empfehlen Ihnen die Einnahme, wenn Sie Ihre Ernährung zusätzlich absichern wollen und Ihr Immunsystem unterstützen wollen. Nicht nur in der kalten Jahreszeit.

2. Wie nehme ich das Produkt ein?

MEDIBOND Immun Lutschtabletten können Sie ohne weitere Zugabe von Wasser einnehmen. Nehmen Sie täglich eine Tablette. Lutschen Sie diese oder lassen diese langsam unter der Zunge zergehen. Für die bestmögliche Verträglichkeit empfehlen wir die Aufnahme zwischen den Mahlzeiten.

3. Wie lange sollte ich die MEDIBOND Immun Lutschtabletten einnehmen?

MEDIBOND Immun Lutschtabletten sind so dosiert, dass eine tägliche Einnahme in genannter Dosierung keine negativen Effekte hat. Eine zeitliche Limitierung ist nicht notwendig. Das Produkt ist für die kontinuierliche Anwendung geeignet.

4. Wie sollte MEDIBOND ImmunLutschtabletten gelagert werden?

Verwenden Sie MEDIBOND Immun Lutschtabletten nicht mehr nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Die Lutschtabletten trocken und lichtgeschützt in der Packung kühl (+4°C bis +25 °C) aufbewahren. Aufgrund der hygienischen Blisterverpackung können Sie für die Reise einzelne Lutschtabletten oder Blisterelemente abtrennen und so einfacher transportieren.

5. Gibt es Wechselwirkungen oder Kontraindikationen?

Nahrungsmittel mit hohem Gehalt an Phytinen (z.B. Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse) reduzieren die Zinkaufnahme in den Blutkreislauf. Achten Sie deshalb darauf die Lutschtabletten nicht nach einer Mahlzeit einzunehmen. Für Schwangere und Stillende erst nach Rücksprache mit dem Arzt empfohlen! Achten Sie darauf, dass bei Einnahme von Antibiotika oder Penicillamin ein zeitlicher Abstand von 3 Stunden gelassen wird.

6. Rechtliche Pflichtenhinweise

Verwenden Sie Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Lagern Sie die Lutschtabletten außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.

Ihr Team der MEDIBOND HealthCare
wünscht Ihnen alles Gute für die Gesundheit

MEDIBOND Healthcare GmbH
Bandstahlstr. 1
58093 Hagen

MEDIBOND®
MEDIBOND®
MEDIBOND®
MEDIBOND®
MEDIBOND®