

Gebrauchsanweisung

Lefax[®]

intens Flüssigkapseln
mit 250 mg Simeticon



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben sich mit **Lefax® intens Flüssigkapseln** für ein Produkt entschieden, das Ihnen bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden schnell und zuverlässig hilft.

Dabei ist es sehr gut verträglich.

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

- // Damit Sie einen bestmöglichen Behandlungserfolg erzielen, sollten **Lefax® intens Flüssigkapseln** vorschriftsmäßig wie unten beschrieben angewendet werden.
- // Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Darüber hinaus berät Sie Ihr Arzt oder Apotheker.
- // Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

- 1. Was sind Lefax[®] intens Flüssigkapseln und wofür werden sie angewendet?** >

- 2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lefax[®] intens Flüssigkapseln beachten?** >

- 3. Wie sind Lefax[®] intens Flüssigkapseln einzunehmen?** >

- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?** >

- 5. Wie sind Lefax[®] intens Flüssigkapseln aufzubewahren?** >

- 6. Weitere Informationen** >

1. Was sind Lefax® intens Flüssigkapseln und wofür werden sie angewendet?

Dieses Medizinprodukt enthält Simeticon, eine Substanz mit entschäumender und schaumverhütender Wirkung.

Lefax® intens Flüssigkapseln werden angewendet

- // zur Linderung und symptomatischen Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden wie Blähungen (Meteorismus), Völlegefühl, Aufstoßen, krampfartige Bauchschmerzen, postoperative gasbedingte Schmerzen und funktionelle Dyspepsie,
- // zur Vorbereitung der Diagnostik im Bauchbereich, wie z.B. Endoskopie, Röntgen und Sonographie.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Lefax® intens Flüssigkapseln beachten?

Lefax® intens Flüssigkapseln dürfen nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile von Lefax® intens Flüssigkapseln sind.

Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u.U. zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Während Schwangerschaft und Stillzeit

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von Lefax® intens Flüssigkapseln während der Schwangerschaft und Stillzeit, da Simeticon aus dem Darm unverändert wieder ausgeschieden und nicht vom Körper aufgenommen wird. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, zuvor den Arzt zu fragen.

Anwendung bei Kindern

Für Kinder unter 14 Jahren werden andere Darreichungsformen empfohlen, z. B. Lefax® Pump-Liquid oder Lefax® Kautabletten.

Bei Einnahme von Lefax® intens

Flüssigkapseln mit anderen Präparaten

Klinisch relevante Wechselwirkungen sind bisher nicht bekannt.

3. Wie sind Lefax® intens Flüssigkapseln einzunehmen?

Nehmen Sie Lefax® intens Flüssigkapseln immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsanweisung ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Dosierung und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Lefax® intens Flüssigkapseln nicht anders verordnet hat.

// Bei gasbedingten Magen-Darm-Beschwerden:

Alter	Einzel-dosis	Tages-gesamtdosis
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1 Weichkapseln (entsprechend 250 mg Simeticon)	4 Weichkapseln (entsprechend 1000 mg Simeticon)

// Zur Vorbereitung für bildgebende Untersuchungen:

Alter	am Tag vor der Untersuchung	am Morgen der Untersuchung
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren	1–2 Weichkapseln (entsprechend 250 mg bis 500 mg Simeticon)	1 Weichkapseln (entsprechend 250 mg Simeticon)

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

Lefax® intens Flüssigkapseln können, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden, aber nicht länger als 30 Tage.

Wie sind Lefax® intens Flüssigkapseln einzunehmen?

Lefax® intens Flüssigkapseln sind zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen einzunehmen. Die Weichkapseln werden unzerkaut mit genügend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) geschluckt.

Was ist zu tun, wenn Sie eine größere Menge Lefax® intens Flüssigkapseln eingenommen haben als Sie sollten?

Auch große Mengen werden problemlos vertragen, da die Wirksubstanz der Weichkapseln ausschließlich physikalisch wirkt und biologisch und chemisch vollkommen inaktiv ist.

Was ist zu tun, wenn Sie die Einnahme von Lefax® intens Flüssigkapseln vergessen haben?

Führen Sie die Behandlung ohne Änderung der Dosierung fort.

Was passiert, wenn Sie die Einnahme von Lefax® intens Flüssigkapseln vorzeitig beenden?

In diesem Fall kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von Lefax® intens Flüssigkapseln wurden bisher nicht beobachtet.

Der Wirkstoff Simeticon löst den Schaum im Magen und Darm auf und wird vom Magen-Darm-Trakt nicht aufgenommen. Deshalb sind auch bei großen Mengen keine Nebenwirkungen durch Simeticon zu erwarten.

Falls Sie trotzdem Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte dem Arzt oder Apotheker mit.

5. Wie sind Lefax[®] intens Flüssigkapseln aufzubewahren?

Dieses Produkt ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Es darf nach dem auf dem Umkarton und dem Blister aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwendet werden.

Aufbewahrungshinweis

Lefax[®] intens Flüssigkapseln nicht über 25°C lagern!

6. Weitere Informationen

1 Weichkapsel enthält 250 mg Simeticon.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gelatine, Glycerol, gereinigtes Wasser.

Lefax[®] intens Flüssigkapseln sind in Packungen mit 20 und 50 Weichkapseln erhältlich.

Medizinprodukt

C € 0482



Hersteller

HÄLSA Pharma GmbH
Maria-Goeppert-Straße 5
23562 Lübeck
Deutschland

Info@haelsa.de

Vertreiber

Bayer Vital GmbH
51368 Leverkusen
Deutschland

Stand der Information: November 2014