

Migravent: Zum Diätmanagement bei Migräne.

Nährwertangaben	pro 2 Kapseln (=Einzelportion)	pro 4 Kapseln (=Tagesportion)	pro 100 g
Energie	0 kJ / 0 kcal	0 kJ / 0 kcal	17 kJ / 4 kcal
Fett	0 g	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g	0 g
Kohlenhydrate	0 g	0 g	1,0 g
davon Zucker	0 g	0 g	0 g
Eiweiß	0 g	0 g	0 g
Salz	0 g	0 g	0 g
Vitamin A (RE*)	375 µg	750 µg	26786 µg
Vitamin C	100 mg	200 mg	7143 mg
Vitamin E (alpha-TE**)	67 mg	134 mg	4786 mg
Thiamin	2,5 mg	5,0 mg	179 mg
Riboflavin	200 mg	400 mg	14286 mg
Niacin (NE***)	10 mg	20 mg	714 mg
Vitamin B6	2,5 mg	5,0 mg	179 mg
Vitamin B12	3,0 µg	6,0 µg	214 µg
Folsäure	200 µg	400 µg	14286 µg
Vitamin D	2,5 µg	5,0 µg	179 µg
Pantothensäure	5,0 mg	10 mg	357 mg
Biotin	83 µg	165 µg	5893 µg
Magnesium	300 mg	600 mg	21429 mg
Eisen	0,4 mg	0,8 mg	29 mg
Zink	2,5 mg	5,0 mg	179 mg
Mangan	1000 µg	2000 µg	71429 µg
Kupfer	250 µg	500 µg	17857 µg
Chrom	15 µg	30 µg	1071 µg
Molybdän	30 µg	60 µg	2143 µg
Selen	25 µg	50 µg	1786 µg
Natrium	0 mg	0 mg	0 mg
Coenzym Q10	75 mg	150 mg	5357 mg
Bioflavonoide	2,5 mg	5,0 mg	179 mg

*Retinoläquivalente

**Tocopheroläquivalente

***Niacinäquivalente

Zutaten

Magnesiumoxid; Riboflavin (Vitamin B2); Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle); Vitamin C; Coenzym Q10; Vitamin E; Zinkgluconat; Kartoffelstärke; Selenhefe; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Niacin; Calcium-D-pantothenat; Thiamin (Vitamin B1); Eisengluconat; Farbstoffe: Titandioxid, Riboflavine; Mangansulfat; Citrus-Bioflavonoide; Vitamin B6; Kupfersulfat; Vitamin A; Folsäure; Biotin; Chrom-(III)-chlorid; Natriummolybdat; Vitamin B12; Vitamin D.

Wichtige Hinweise

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei Migräne.

Aufgrund des erhöhten Bedarfs in dem besonderen Anwendungsbereich sind Magnesium, alle weiteren Mineralstoffe und Vitamine erhöht. Die Zusammensetzung ist spezifisch auf den Nährstoffbedarf von Personen mit Migräne abgestimmt. Diese Bedarfsdeckung ist durch klinische Daten bei Migräne-Patienten belegt.

Migravent[®] ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Die Anwendung sollte gemäß der Gebrauchsempfehlung täglich über einige Monate erfolgen. Während der Anwendung von Migravent[®] sollten Sie keine weiteren magnesium- oder riboflavinhaltigen Präparate einnehmen. Schwangere und Kinder sollten die Anwendung mit ihrem Arzt abstimmen.

Riboflavin ruft eine unbedenkliche gelbliche Färbung des Urins hervor. Breiige Stühle und Völlegefühl können auftreten. Wie alle magnesiumhaltigen Präparate sollte Migravent[®] bei gestörter Nierenfunktion nicht angewendet werden. Im Hinblick auf mögliche Resorptionsbeeinträchtigungen sollte generell ein Abstand von 1-2 Stunden zwischen der Einnahme von Migravent[®] und Arzneimitteln mit den folgenden Wirkstoffen eingehalten werden: Tetracycline, eisenhaltige Verbindungen, Natriumfluorid, Isoniazid, Chlorpromazin und Digoxin.

Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren!
Gelatinefrei.