30105198_UP.ai 1 26.08.14 12:12

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text limit

ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG ! ACHTUNG !

ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION !

Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac Forschung stehen mit einer jahrzehnte langen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys.

Novalac 1 ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

ANWENDUNG

Novalac 1 ist eine Säuglingsmilchnahrung von besonders ausgesuchter Qualität und eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen von der Geburt an bis zum 6. Monat, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0–1	1–2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Fläschchen pro Tag	6–7	5
Anzahl Messlöffel	3–4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90–120	120

2–3	3–4	4–5	5–6
6	6,5	7	7,5
5	5	4	4
6–5	6	6–7	6–7
120–150	180	180–210	180–210

Standardauflösung:
13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser
= 100 ml trinkfertige Nahrung.

1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g **Novalac 1**

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Wenn Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. Verwenden Sie für Ihr Baby nach Rücksprache mit Ihrem Kinderarzt bei Kuhmilch-Eiweißallergie, bei einer Frühgeburt oder geschwächtem Immunsystem nur geeignete Spezialnahrungen.

Novalac 1 kann vom 1. Fläschchen bis zum 6. Monat als alleinige Nahrung gegeben werden, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird. Für Babys ab dem 6. Monat steht Ihnen **Novalac 2** Folgemilch zur Verfügung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis: siehe Bodenaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Nuckeln bei der Gabe der Flaschennahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zähne Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verwerfen.

Ein Produkt von **UP Euronord SA**
ICC, Route de Pré-Bois 20, Case Postale 1876
1215 Genf – Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
Herbeller Straße 11, D-50858 Köln
www.novalac.de

℮ 800 g

Unter Schutzatmosphäre verpackt

Novalac

Säuglingsmilchnahrung

1

0–6 Monate

800 g

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt		100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100 kcal
Energie	kcal	505,3	65,7	100
	kJ	2115,7	275	418,7
Fett davon	g	25,5	3,3	5
- gesättigt	g	12,4	1,6	2,5
- einfach ungesättigt	g	6,5	0,8	1,3
- mehrfach ungesättigt	g	5,3	0,7	1
Kohlenhydrate davon	g	57,8	7,5	11,4
- Zucker	g	41,1	5,3	8,1
Eiweiß	g	11	1,4	2,2
Natrium	g/mg	0,375/150	0,05/19,5	0,07/29,7
Mineralstoffe				
Kalium	mg	470	61,1	93
Chlorid	mg	100	19	59,4
Calcium	mg	380	49,4	75,2
Phosphor	mg	230	29,9	45,5
Magnesium	mg	45	5,9	8,9
Eisen	mg	6	0,8	1,2
Zink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	65	8,5	12,9
Kupfer	µg	400	52	79,2
Mangan	µg	35	4,6	6,9
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<450	<59	<90
Vitamine				
A	µg RE	450	58,5	89,1
B_1	µg	400	52	79,2
B_2	µg	800	104	158,3
B_6	µg	300	39	59,4
B_{12}	µg	1,3	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	11,9
D_3	µg	7,5	1	1,5
E	mg α-TE	12,8	1,7	2,5
K	µg	30	3,9	5,9
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg	2,4	0,3	0,5
Folsäure	µg	60	7,8	11,9
Biotin	µg	15	2	3
Cholin	mg	100	13	19,8
Inositol	mg	45	5,9	8,9
Taurin	mg	44	5,7	8,7
L-Carnitin	mg	8	1	1,6

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)
www.novalac.de

ZUTATEN

Magermilchpulver, Entmineralisiertes Molkepulver (**Milch**)*, pflanzliche Öle (Palm-, Soja- und Kokosnussöl), Maltodextrin, Kaliumhydroxid, Calciumcitrat, Emulgator (**Soja**lecithin), Vitamine (A, B_1, B_2, B_6, B_{12}, C, D_3, E, K), Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Calciumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Tocopherole), Magnesiumoxid, Kupfersulfat, L-Carnitin, Mangansulfat, Natriumselenit, Cholinbitartrat, Dinatriumphosphat, Inositol, Kaliumiodid.

* Die Proteinquelle in **Novalac 1** ist Kuhmilch.

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

1. Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Bereiten Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
2. Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufter – Messlöffel Novalac hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
3. Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
4. Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

PMS 2202 C
PMS 288 C
Litho: 2362399
Operator: MM

143,5 mm

14 mm Lackfrei | 16,6 mm Textfrei

412,7 mm