

Background limit (overflow 3mm)

Cut

Text block

Qualität ohne Kompromisse

Novalac stellt höchste Qualitätsansprüche an die Herkunft der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung. Im Zentrum der Novalac-Forschung stehen mit einer jahrzehntelangen Erfahrung und Kompetenz in der pädiatrischen Ernährungswissenschaft, die Entwicklung und das optimale Wachstum von Babys. **Novalac HA** ist Teil eines individuellen Sortiments von Säuglingsmilchnahrungen, die auf den gesamten Ernährungsbedarf von Säuglingen in den verschiedenen Entwicklungsphasen und deren besonderen Anforderungen abgestimmt sind.

ANWENDUNG

Novalac HA ist eine andickende hypoallergene Säuglingsmilchnahrung mit aufgeschwemmtem (hydrolysiertem) Milch-eiweiß und eignet sich für die besondere Ernährung von allergiegefährdeten Säuglingen von der Geburt an, wenn nicht oder nur teilweise gestillt wird.

DOSIERUNG

Alter (Monate)	0-1	1-2
Säuglingsgewicht (kg)	4	5
Anzahl Flaschen pro Tag	6-7	5
Anzahl Messlöffel	3-4	4
Abgekochtes Wasser (ml)	90-120	120

	2-3	3-4	4-5	5-6	>6
6	6,5	7	7,5	>7,5	
5	5	4	4	3*	
4-5	6	6-7	6-7	7	
120-150	180	180-210	180-210	210	

*bei zusätzlicher Nahrungsaufnahme
 Standardaufkündigung: 13 g Pulver + 90 ml abgekochtes Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Nahrung.
 1 gestrichener Messlöffel entspricht ca. 4,3 g Novalac HA.
 Nach Absprache mit Ihrem Kinderarzt sollen Menge und Anzahl aller Tagesmahlzeiten auf die Bedürfnisse Ihres Babys abgestimmt werden. Bitte halten Sie die Dosierungsempfehlungen genau ein.

WICHTIGE HINWEISE

Muttermilch ist die beste Ernährung für Ihr Baby! Wenn Sie eine Säuglingsnahrung verwenden wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt. **Novalac HA** ist geeignet zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen bis zum 6. Lebensmonat. Ab dem 6. Monat sollte **Novalac HA** in Absprache mit dem Kinderarzt mit Beikostmahlzeiten kombiniert werden. Im Falle einer Nahrungseiweißallergie, niedrigem Geburtsgewicht, Galactosämie, Lactoseintoleranz und Glucose-, Galactose-Malabsorption, wenden Sie sich bitte an Ihren Kinderarzt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Mindestens haltbar bis - siehe Bedruckaufdruck. Nach Öffnung der Dose innerhalb von max. 3 Wochen aufbrauchen.
- Dose nach Gebrauch gut mit dem Plastikdeckel verschließen und kühl und trocken aufbewahren.
- Ein zu langes und häufiges Ruckeln bei der Gabe der Flaschernahrung vermeiden, um Karies zu verhindern.
- Putzen Sie die Zäune Ihres Babys immer nach der letzten Flasche.
- Flasche immer direkt vor dem Füttern zubereiten und nicht vorbereiten.
- Flasche innerhalb 1 Stunde nach Zubereitung verbrauchen und Reste nicht wieder aufwärmen, sondern verworfen.

Aufgrund der besonderen Zusammensetzung besitzt **Novalac HA** im Vergleich zu Standardmilchnahrungen einen speziellen Geschmack und Geruch. Möglicherweise müssen Sie **Novalac HA** mehr schütteln, um das Pulver aufzulösen. Für eine bessere Anwendung ist es möglich, einen Sauger mit regelbarem Nahrungsfluss zu verwenden. Ohne die Gesundheit Ihres Babys zu beeinträchtigen, kann es zu weniger festen und/oder grünen Stuhlgingen kommen.

Ein Produkt von **UP Euronord SA**
 CC, Route de Pré-Bols 20, Case Postale 1876
 1215 Grenchen - Schweiz

Vertrieb durch **careforce pharma GmbH**
 Herbellor Straße 11, D-50858 Köln
 www.novalac.de

e 800 g



Unter Schutzatmosphäre verpackt

Novalac HA

Säuglingsmilch-nahrung



800 g
Hypoallergene Säuglingsmilchnahrung

0-12 Monate

ZUSAMMENSETZUNG

im Durchschnitt	100g Pulver	100ml trinkfertige Nahrung	100 kcal	
Energie	kcal	505,9	10,7	100
	kJ	2116,5	225,1	418,7
Fett (Gesamt)	g	15,3	3,3	3
- gesättigt	g	9,9	1,3	2
Gesättigt ungesättigt	g	9,2	1,2	1,8
- mehrfach ungesättigt	g	5,1	0,7	1
Kohlenhydrate	g	57	12,4	11,3
- Zucker	g	25	3,3	4,9
Eiweiß	g	12	1,6	2,4
Natrium	g/mg	0,425/170	0,06/22,1	0,08/33,6
Mineralstoffe				
Natrium	mg	500	51	16,1
Chlorid	mg	400	52	79,1
Calcium	mg	400	52	79,1
Phosphor	mg	250	32,5	49,1
Magnesium	mg	85	10,6	16,1
Eisen	mg	6	0,8	1,2
Zink	mg	4,5	0,6	0,9
Jod	µg	65	8,5	12,9
Kupfer	µg	350	45,5	69,2
Mangan	µg	50	6,5	9,9
Selen	µg	10	1,3	2
Fluorid	µg	<350	<46	<70
Chrom	µg	25	3	4,5
Molybdän	µg	25	3	4,5
Vitamine				
A	µg RE	450	58,5	88
B1	µg	400	52	79,1
B2	µg	850	108	162,3
B6	µg	300	39	59,3
B12	µg	1,5	0,2	0,3
C	mg	60	7,8	11,9
D3	µg	725	93	140,5
E	mg α-TE	11	1,4	2,2
K1	µg	30	3,9	5,9
Niacin	mg	4,5	0,6	0,9
Pantothensäure	mg	3,4	0,3	0,5
Folsäure	µg	60	7,8	11,9
Biotin	µg	15	2	3
Cholin	mg	80	10,4	15,6
Inositol	mg	25	3,3	4,9
Inulin	mg	40	5,2	7,9
L-Carnitin	mg	30	3,3	5

Beratungshotline 0800-6682522 (kostenlos)
 www.novalac.de

ZUTATEN

Maltodextrin, Lactose (Milch), pflanzliche Öle (Palm-, Raps-, Sonnenblumen- und Kokosöl), Maltstärke, hydrolysiertes **Milchprotein***, Inositoltriphosphat, Emulgator (Sojalecithin), Kaliumchlorid, Vitamin (A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K1, Biotin, Folsäure, Niacin, Pantothensäure), Dinatriumphosphat, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, Magnesiumoxid, Taurin, Ebersulfat, Inositol, Kaliumhydroxid, L-Carnitin, Zinksulfit, Antioxidationsmittel (Ascorbylphosphat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumoxid, Natriumacetat).

* Die Proteinquelle in **Novalac HA** ist Kuhmilch.

ZUBEREITUNG

Für die Gesundheit Ihres Babys ist es wichtig, die Hinweise zur hygienischen Zubereitung genau zu beachten.

- Vor der Zubereitung gründlich Hände waschen. Beistellen Sie jede Flasche frisch zu. Flasche und Sauger reinigen und 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Frisches Leitungswasser 5 Minuten lang abkochen und auf 40°C abkühlen. Oder kohlensäurearmes Mineralwasser auf maximal 40°C erwärmen. Erforderliche Wassermenge in die Flasche füllen.
- Entsprechende Anzahl gestrichener – nicht gehäufte – Messlöffel **Novalac** hinzugeben. Bitte ausschließlich den Messlöffel aus der Packung benutzen.
- Flasche schließen und schütteln, bis das Pulver im Wasser vollständig aufgelöst ist.
- Temperatur (37°C) an der Innenseite des Handgelenks überprüfen. Sofort die Flasche geben und innerhalb einer Stunde füttern. Nahrungsreste nicht aufwärmen oder wieder verwenden.

143,5 mm