

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup

Wirkstoff: Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt

Sirup zum Einnehmen für Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup beachten?
3. Wie ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup und wofür wird er angewendet?

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup ist ein pflanzliches Arzneimittel, das bei Erkältungskrankheiten der Atemwege zur Linderung der Beschwerden angewendet wird. Wenn Sie sich nach 5 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup beachten?

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup darf nicht eingenommen werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Med. Spitzwegerich einnehmen. Bei länger andauernden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Med. Spitzwegerich Husten-Sirup soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

Einnahme von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht eingenommen werden. Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. empfohlener Dosierung ist keine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder beim Bedienen von Maschinen zu erwarten.

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup enthält eine Mischung aus Glucose, Fructose und Sucrose. Bitte nehmen Sie Med. Spitzwegerich Husten-Sirup daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Eine Dosis (10 ml) enthält 5,7 g einer Mischung aus Sucrose (Zucker), Glucose und Fructose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Der häufige und dauernde Gebrauch von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup kann schädlich für die Zähne sein (Karies).

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup enthält 12,3 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosieranleitung werden bei jeder Einnahme pro 10 ml bis zu 1,44 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

3. Wie ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis: Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren nehmen 3 bis 4 mal täglich 10 ml (Dosierhilfe) ein. (Die empfohlene Dosierung entspricht einer Tagesdosis von 3,6 g bis 4,8 g Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt.)

Wenn Sie eine größere Menge von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup eingenommen haben, als Sie sollten

Benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie eine größere Menge von diesem Arzneimittel eingenommen haben, als Sie sollten. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie die Einnahme von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup abbrechen

Das Absetzen von Med. Spitzwegerich Husten-Sirup ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Gelegentlich kann Durchfall auftreten (Häufigkeit: weniger als 1 von 1.000 Behandelten).

Sehr selten kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut kommen (Häufigkeit: weniger als 1 von 10.000 Behandelten).

Methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Med. Spitzwegerich Husten-Sirup aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett nach „verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C aufbewahren. In der Originalverpackung fest verschlossen und vor Licht geschützt aufbewahren.

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup ist nach Anbruch des Behältnisses 4 Wochen verwendbar.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Med. Spitzwegerich Husten-Sirup enthält

Der Wirkstoff ist Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt.

100 g (83,33 ml) Med. Spitzwegerich Husten-Sirup enthalten als Wirkstoff:

10 g Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt (1:1), Auszugsmittel Ethanol 40 % (V/V).

Die sonstigen Bestandteile sind:

Benzoessäure, Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Sucrose (Saccharose), Ethanol 96 % (V/V), Honig, gereinigtes Wasser.

Wie Med. Spitzwegerich Husten-Sirup aussieht und Inhalt der Packung

Med. Spitzwegerich Husten-Sirup ist ein brauner Sirup zum Einnehmen und in Packungen mit 100 ml und 250 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik

Lindenstraße 11

07426 Königsee

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2021.

Friebel-Druck, Saalfeld	
Freigabe	<input type="checkbox"/>
nochmalige Vorlage	<input type="checkbox"/>
Datum/Unterschrift _____	

1. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>
2. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>
3. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>
4. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>
5. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>
6. Korrekturabzug	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Korrekturabzug	<input type="checkbox"/>

Format: A5 (148 x 210 mm)
Farben: 1/1-farbig (schwarz)

Schriftart: Times New Roman
Schriftgröße: 8 pt
Zeilenabstand: 8,7 pt

Stand: 28.10.2021, 08.05 Uhr
Bearbeiter: S. Range