

# Sanum

## Pefrakehl® D5 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen, Einreiben und Inhalieren
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Candida parapsilosis e volumine cellulae D5 dil.
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Candida parapsilosis e volumine cellulae D5 dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Zum Einnehmen: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 1-2 mal täglich je 5 Tropfen ein. Zum Einreiben: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren reiben 1 mal täglich 5-10 Tropfen in die Ellenbeuge ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Pefrakehl® D5 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Pefrakehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Candida parapsilosis ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Pilzen (Candida parapsilosis)

- &#8226; Autoimmunerkrankungen
- &#8226; Kindern unter 12 Jahren
- &#8226; Schwangeren und Stillenden

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen:                      Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Pefrakehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen:                      Keine bekannt.

---

Zusatzhinweis:                              Candida parapsilosis ist als Wirkstoff auch in dem Kombinationspräparat Exmykehl® enthalten.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform:                                  10 ml Tropfflasche  
    10x 10 ml Bündelpackung.

---

Stand vom:                                      001