

# Sanum

## Pinikehl® D4 Zäpfchen



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Darreichungsform:               | Zäpfchen zur rektalen Anwendung   |
| Präparatgruppe:                 | Pilzpräparat  |
| Wirkstoff:                      | Fomitopsis pinicola e volumine mycelii (lyophil., steril.) D4   |
| Zusammensetzung:                | 1 Zäpfchen enthält: 0,2 g Fomitopsis pinicola e volumine mycelii D4 trit. (HAB, Vorschrift 6). Sonstiger Bestandteil: Hartfett.   |
| Erfahrungsgemäß angewendet bei: | Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.   |
| Anwendung:                      | Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren führen 1-3 mal wöchentlich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After ein.<br>Nach längstens 4 Wochen Therapie dauer sollte Pinikehl® D4 abgesetzt werden.   |
| Nebenwirkungen:                 | Aufgrund des Gehaltes von Pinikehl® D4 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Fomitopsis pinicola ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen. |
| Gegenanzeigen:                  | Nicht anwenden bei:<br>&#8226; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Fomitopsis pinicola<br>&#8226; Kindern unter 12 Jahren<br>&#8226; Schwangeren und Stillenden   |

---

Unerwünschte Reaktionen:

---

Wechselwirkungen:                      Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Pinikehl® D4 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

---

Vorsichtsmaßnahmen:                      Keine bekannt.

---

Hinweis:    Enthält Lactose.

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform:                                      Packung mit 10 Zäpfchen, Bündelpackung mit 10x 10 Zäpfchen.

---

Stand vom:    006