SE Prontosan® sårgel X

Anvisningar för rengöring, sköljning, befuktning och dekontaminering av akuta, svårläkta och infekterade sår och brännskador.

1. Inledning: Kroniska hudsår är ofta belagda med ett skikt av nekrotisk vävnad och/eller biofilm. Dessa belägningar är svåra att avlägsna och leder till fördröjd sårläkning. Därför är det mycket viktigt med korrekt sårrengöring. Användning av Prontosan® sårgel X ger långvarig rengöring och dekontaminering av sårbädden mellan förbandsbyten.
Akuta sår kräver också ordentlig rengöring eftersom de i allmänhet är förorenade med smuts och mikroorganismer. Dessa föroreningar kan störa den normala sårläkningsprocessen och leda till komplikationer som t.ex. infektion. För akuta traumatiska sår som kräver suturering ska Prontosan® sårgel X appliceras efter kirurgiska ingrepp och suturering.
På grund av den unika kombinationen av ingredienser (dvs. den antimikrobiella substansen, polihexanid, och det yttaktiva medlet, betain), är Prontosan® idealisk för att förhindra att biofilm bildas.

2. Produktprofil och användningsområden:
För rengöring, befuktning och dekontaminering av:
a) akuta (oftast traumatiska) och infekterade sår: - traumatiska sår (t.ex. rivsår, skrubbsår eller hugsår - om suturering är indikerad ska Prontosan® - sårgel X appliceras efter kirurgiska ingrepp),
b) kroniska icke-infekterade och infekterade sår (inklusive komplicerade, svårläkta sår, sår i håligheter och svårtillgängliga sår),
c) postoperativa sår,
d) termiska och kemiska brännskador samt brännskador efter strålbehandling (ta till 4e gradens brännskador, kylskador),
e) frysskador.

3. Allmän användning: För bästa resultat, ska Prontosan® sårspolningslösning (se separat produktinformation) användas för rengöring av såret och huden runt såret före behandling med Prontosan® sårgel X.
Prontosan® sårgel X ska appliceras rikligt på sårbädden. Hålrum och fickor ska fyllas med Prontosan® sårgel. Förband, gasbindor, kompresser eller andra absorberande fyllnadsmedel kan fuktas med Prontosan® sårgel X innan förbandet appliceras.
Prontosan® sårgel X kan vara kvar på såret till nästa byte av förband.
Beroende på hur ofta förbandsbyten görs, används varierande mängder av Prontosan® sårgel X. Sårytan ska hela tiden hållas fuktig så att tillräcklig rengöring och dekontaminering kan säkerställas. Beläggningar tas bort försiktigt och av-lägsnas vid nästa byte av förband. Applicering ska ske tillräckligt ofta för att alla beläggningar och föroreningar ska kunna avlägsnas lätt och för optimal beredning av sårbädden.
Prontosan® sårgel X ska inte vara i kontakt med såret längre än 30 dagar i följd.

4. Vävnadstolerans och biokompatibilitet: Dermatologiskt testad och utvärderad som inte irriterande och väl tolererad, är smärtfri och hämmar inte granulering eller epitelialisering.

5. Biverkningar:
I mycket sällsynta fall kan det förekomma en svag brännande känsla när Prontosan® applicerats men denna försvinner vanligen efter några minuter.
Prontosan® kan orsaka allergiska reaktioner som kläda (urtikaria) och utslag (exantem). I sällsynta fall (färre än 1 av 10 000), har anafylaktisk chock rapporterats.

6. Kontraindikationer:
Prontosan® ska inte användas:
a) om det är känt att patienten är allergisk eller vid misstanke att patienten kan vara allergisk mot någon av ingredienserna i produkten.
b) på CNS eller hjärnhinnorna.
i) mitten- eller inneröra.
j) ögonen.
e) på hyalint brusk och vid aseptisk ledkirurgi. Om Prontosan® kommer i kontakt med aseptiskt brusk ska det omedel-bart spolas med Ringers lösning eller normal saltlösning.
f) i kombination med andra antiinfektiva tensider.
g) i kombination med tvål, salvor, oljor, enzymer etc. Dessa ämnen ska nogrannt avlägsnas från såret före användning.

7. Användningsrestriktioner:
Graviditet och amning:Det finns inga bevis för mutagen toxicitet eller embryotoxicitet förknippad med ingredienserna i denna produkt. Eftersom det inte finns någon systematisk reabsorption av polihexanid är det överflödig till bröstmjölk osannolik. På grund av brist på relevanta kliniska prövningar och klinisk erfarenhet av gravida och ammande kvinnor, bör Prontosan® sårgel X i sådana fall endast användas efter noggrann medicinsk konsultation.
Nyfödda och spädbarn: På grund av otillräckliga kliniska data, bör Prontosan® sårgel X endast användas sekvestrerade under noggrann medicinsk övervakning på nyfödda och spädbarn.

8. Allmänna säkerhetsanvisningar:
Endast för utvärtes bruk.
Ska inte användas vid infusion eller injektion.
Ska inte sväljas.
Skadade tuber ska inte användas.
Ställ inte tuberna i direkt solljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

9. Sammanfattning/teknisk information:
Prontosan® sårgel X är en produkt med konserveringsmedel som tillhandahåller en antimikrobiell barriär. Tuben ska stängas omedelbart efter användning så att kontaminering förhindras. Den övre delen av tuben sku- nder användning skyddas från kontaminering. Tuber som har kommit i direkt kontakt med såret eller har blivit kontaminerade på annat sätt måste kasseras.
Sammansättning: Renat vatten, glycerol, hydroxyethylcellulosa, yttaktivt betain, 0,1 % polyaminopropyl biguanid (polihexanid).
Tuben är apyrogen.
Produkten är apyrogen och ska inte användas på en samma patient.
Utseende och lukt: klar, färglös och nästan luktfri vattenlösig gel.
Hållbarhet: 24 månader, förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet efter första öppnandet: 8 veckor
Ursprungsförslutning: Produkten är inte längre steril efter första öppnandet.

10. Vävnadstolerans och biokompatibilitet: Dermatologiskt testad och utvärderad som inte irriterande och väl tolererad, är smärtfri och hämmar inte granulering eller epitelialisering.

5. Biverkningar:
I mycket sällsynta fall kan det förekomma en svag brännande känsla när Prontosan® applicerats men denna försvinner vanligen efter några minuter.
Prontosan® kan orsaka allergiska reaktioner som kläda (urtikaria) och utslag (exantem). I sällsynta fall (färre än 1 av 10 000), har anafylaktisk chock rapporterats.

6. Kontraindikationer:
Prontosan® ska inte användas:
a) om det är känt att patienten är allergisk eller vid misstanke att patienten kan vara allergisk mot någon av ingredienserna i produkten.
b) på CNS eller hjärnhinnorna.
i) mitten- eller inneröra.
j) ögonen.
e) på hyalint brusk och vid aseptisk ledkirurgi. Om Prontosan® kommer i kontakt med aseptiskt brusk ska det omedel-bart spolas med Ringers lösning eller normal saltlösning.
f) i kombination med andra antiinfektiva tensider.
g) i kombination med tvål, salvor, oljor, enzymer etc. Dessa ämnen ska nogrannt avlägsnas från såret före användning.

7. Användningsrestriktioner:
Graviditet och amning:Det finns inga bevis för mutagen toxicitet eller embryotoxicitet förknippad med ingredienserna i denna produkt. Eftersom det inte finns någon systematisk reabsorption av polihexanid är det överflödig till bröstmjölk osannolik. På grund av brist på relevanta kliniska prövningar och klinisk erfarenhet av gravida och ammande kvinnor, bör Prontosan® sårgel X i sådana fall endast användas efter noggrann medicinsk konsultation.
Nyfödda och spädbarn: På grund av otillräckliga kliniska data, bör Prontosan® sårgel X endast användas sekvestrerade under noggrann medicinsk övervakning på nyfödda och spädbarn.

8. Allmänna säkerhetsanvisningar:
Endast för utvärtes bruk.
Ska inte användas vid infusion eller injektion.
Ska inte sväljas.
Skadade tuber ska inte användas.
Ställ inte tuberna i direkt solljus.
Förvaras utom räckhåll för barn.

9. Sammanfattning/teknisk information:
Prontosan® sårgel X är en produkt med konserveringsmedel som tillhandahåller en antimikrobiell barriär. Tuben ska stängas omedelbart efter användning så att kontaminering förhindras. Den övre delen av tuben sku- nder användning skyddas från kontaminering. Tuber som har kommit i direkt kontakt med såret eller har blivit kontaminerade på annat sätt måste kasseras.
Sammansättning: Renat vatten, glycerol, hydroxyethylcellulosa, yttaktivt betain, 0,1 % polyaminopropyl biguanid (polihexanid).
Tuben är apyrogen.
Produkten är apyrogen och ska inte användas på en samma patient.
Utseende och lukt: klar, färglös och nästan luktfri vattenlösig gel.
Hållbarhet: 24 månader, förvaras i rumstemperatur. Hållbarhet efter första öppnandet: 8 veckor
Ursprungsförslutning: Produkten är inte längre steril efter första öppnandet.

SI Prontosan® Wound Gel X

Navodila za čiščenje, vlaženje in razkuževanje akutnih in kroničnih in vnetih ran ter tudi opeklin.

1. Uvod:
Kronične rane na koži so pogosto prevlečene s suho krasto, z nekrotičnim tkivom in/ali z biofilmom. Te plasti je težko odstraniti in vodijo do zapoznelega celjenja ran. Zato je pomembno primerno čiščenje rane. Uporaba gela za rane Prontosan® Wound Gel X zagotavlja dolgotrajno čiščenje in razkuževanje dna rane med menjavami obvez.
Akutne rane prav tako zahtevajo ustrezno čiščenje, saj so ponavadi okužene z drobci in mikroorganizmi. Ti kontaminanti lahko motijo normalen proces celjenja rane in privedejo do zapletov, kot je okužba. Za akutne travmatične rane, ki zahtevajo šivanje, mora biti gel za rane Prontosan® Wound Gel X nanesen po kirurškem posegu in šivanju.
Zaradi edinstvene kombinacije sestavin (tj. protimikrobna snov, polihexanid in surfaktant, betain) je Prontosan® idealen za preprečevanje tvorbe biofilma.

2. Profil izdelka in področja uporabe:
Za čiščenje, izpiranje, vlaženje in razkuževanje:
a) akutnih vnetih in nevnetih ran: travmatske rane (npr. laceracije, abrazije ali vbodnine - v primeru šivanja lahko Prontosan® Wound Gel X nanesete šele po kirurškem posegu);
b) kroničnih vnetih in nevnetih ran (vključno s kompleksnimi, trdovratnimi ranami, globokimi ranami in težko dostopnimi ranami);
c) pooperativnih ran;
d) toplotnih in kemičnih opeklin ter opeklin po obsevanju (1.-4. stopnje).
e) ozeblin.

3. Splošna uporaba:
Za optimalne rezultate mora biti raztopina za izpiranje ran Prontosan® Wound Irrigation Solution (glejte ločene informacije o izdelku) uporabljena za čiščenje rane in območja kože okoli rane pred zdravljenjem z gelom za rane Prontosan® Wound Gel X.
Gel za rane Prontosan® Wound Gel X mora biti obilno nanesen na dno rane. Luknje in žepki morajo biti napolnjeni z gelom za rane Prontosan® Wound Gel. Obveze, gaze, obkladki ali drugi vpojni filtri za rane so lahko navlaženi z gelom za rane Prontosan® Wound Gel X pred namestitvijo obveze.
Gel za rane Prontosan® Wound Gel X lahko ostane na rani do naslednje menjave obveze.
Nanesene količine gela za rane Prontosan® Wound Gel X se razlikujejo glede na pogostost menjave obveze. Površina rane mora biti ves čas vlažna, da se zagotovita primerno čiščenje in razkuževanje. Plasti so nežno zrahljane in odstranjene z naslednjo menjavo obveze. Nobena plast ne bi izvedeni obvezi pogosto za omogočanje lažjega odstranjevanja vseh plasti in nekroz ter za optimalno pripravo dna rane.
Gel za rane Prontosan® Wound Gel X ne sme biti v enrehnem stiku z rano dlje kot 30 dni.

4. Biokompatibilnost in prenašanje ga tkiva:
Dermatološko testirana in ocenjena kot snov, ki ne draži in se dobro prenaša; brez bolečin; brez zaviranja granulacije ali epitelizacije.

5. Stranski učinki:
V zelo redkih primerih se lahko pojavi blag pekoč občutek po nanosu Prontosan®-a, ampak ta običajno izgine po nekaj minutah. Prontosan® lahko povzroči alergijske reakcije, kot so srbenje (koprivnica) in izpuščaji (eksantem). V redkih primerih (manj kot 1 od 10.000) so poročali o anafilaktičnem šoku pri uporabi izdelkov Prontosan®.

6. Kontraindikacije:
Prontosan® se ne sme uporabljati:
a) če je znano, da je bolnik alergičen ali pa se predvideva, da bi bolnik lahko bil alergičen na eno od sestavin izdelka;
b) na osrednjem živčevju ali na možganskih ovojnicah;
c) v notranjem ali notranjem ušesu;
d) v očeh;
e) na hialinskem hrustancu in pri kirurškem posegu na aseptičnih sklepih (Če pride Prontosan® v stik z aseptičnim hrustancem, mora biti nemoma izpran z Ringerjevo raztopino ali običajno fiziološko raztopino.);
f) v kombinaciji z aniontskimi tenzidi;
g) v kombinaciji s čistilnimi mili, mazili, olji, encimi itd. Te snovi morajo biti pred uporabo temeljito odstranjene z rane.

7. Omejitve uporabe:
Obdobje nosečnosti in dojenja: Ni dokazov o mutagenih ali toksičnih učinkih za embrio, povezanih s sestavinami tega izdelka. Ker ni sistemske ponovne absorbcije polihexanida, je prenos na materino mleko malo verjeten. Zaradi pomanjkanja relevantnih kliničnih preizkusanj in kliničnih izkušenj z nosečimi in doječimi ženskami, se lahko v teh primerih gel za rane Prontosan® Wound Gel X uporablja samo po skrbnem zdravniškem posvetovanju.
Novorojenčki in dojenčki: Zaradi nezadostnih kliničnih podatkov je treba pri novorojenčkih in dojenčkih gel za rane Prontosan® Wound Gel X uporabljati selektivno in pod strogim zdravniškim nadzorom.

8. Splošna varnostna navodila:
Samo za zunanjo uporabo.
Ne uporabljajte za infuzije ali injekcije.
Ne zaužijte.
Ne uporabljajte poškodovanih tub.
Steklenička hranite stran od neposredne sončne svetlobe.
Hranite izven dosega otrok.

9. Povzetek/tehnični podatki:
Gel za rane Prontosan® Wound Gel X je konzerviran izdelek, ki zagotavlja trajno protimikrobno pregrado. Tubo je treba zapreti takoj po uporabi, da se prepreči kontaminacija. Vrh tube mora biti uporabo zaščiten pred kontaminacijo. Tube, ki so prišle v neposreden stik z rano ali so bile kontaminirane na kakšen drug način, je treba odvreči.
Sestava: prečiščena voda, glicerol, hidroksieticeluloza, surfaktant betain, 0,1 % poliaminopropil biguanid (polihexanid).
Tube se lahko uporabljajo samo za enega bolnika. Videz in vonj: prozoren vodni gel brez barve in praktično brez vonja.
Rok trajanja: 24 mesecev; shranjujte pri sobni temperaturi.
Rok trajanja po prvem odprtju: 8 tednov
Pečat za zaščito izvirnosti: izdelek po prvem odprtju ni več sterilen.

SK Prontosan® Wound Gel X

Pokyny na čistenie, zvlhčovanie a dekontamináciu akútnych, chronických a infekčných kožných rán, ako aj popálenín.

1. Úvod: Chronické povrchové rany sú často pokryté priškvareným, nekrotickým tkanivom a/alebo biovrstvou. Tieto povlaky sa ťažko odstraňujú a spôsobujú predĺženie liečenia rán. Preto je základom správne vyčistenie rany. Použitie Prontosan® Wound Gel X zaistuje dlho trvajúce vyčistenie a dekontamináciu lôžka rany medzi výmenami obväzov.
Akútne rany vyžadujú aj správne čistenie, pretože vo všeobecnosti sú kontaminované bunkovým odpadom a mikroorganizmami. Tieto kontaminujúce látky môžu brániť normálnemu procesu liečenia rane a viesť ku komplikáciám, ako sú infekcie. Pre akútnych traumatických rán, ktoré vyžadujú zošívanie, za Prontosan® Wound Gel X nanesa po chirurgickom zákroku a šití.
Vďaka jedinečnej kombinácii zložiek (t. j. antimikrobiálnej látky, polyhexanidu a surfaktantu – betaínu) je Prontosan® ideálny na zabránovanie vytváraniu biofilmu.

2. Profil produktu a oblasti jeho použitia:
Na čistenie, zvlhčovanie a dekontamináciu:
a) akútnych neinfikovaných a infikovaných ran: traumatické rany (napr. tržné rany, odreniny alebo bodné rany – je-li indikováno šití, měl by se Prontosan® Wound Gel X aplikovat až po chirurgickém zákroku),
b) chronických neinfikovaných a infikovaných ran (včetně komplikovaných, nepoddajných ran, dutin, obtížně se hojících ran).
c) Pooperačních ran.
d) Popálenin tepelných, chemických a po ozáření (1. – 4. stupně).
e) Omrzlin.

3. Všeobecné použití:
Pro dosažení optimálních výsledků je třeba použít Prontosan® roztok k irigaci rány (viz zvláštní informace k výrobku) k čištění rány a kůže okolo rány před léčbou přípravkem Prontosan® gel na rány X.
Prontosan® gel na rány X je třeba aplikovat na lůžko rány. Dutiny a kapsy je třeba vyplnit přípravkem Prontosan® gel na rány. Krytí na rány, gázy, kompresy a další absorpční prostředky k vyplnění rány lze před aplikací navlhčit přípravkem Prontosan® gel na rány X.
Prontosan® gel na rány X může na ráně zůstat až do příštího převazu.
Podle četnosti převazů se aplikují různá množství přípravku Prontosan® gel na rány X. Povrch rány by měl být udržován stále vlhký pro zajištění dostatečného čištění a dekontaminace. Povlaky se jemně uvolní a odstraní při následujícím převazu. Aplikaci je třeba provádět dostatečně často, aby byly pohůtové odstraněny všechny povlaky a nekrózy a pro optimální preparaci lůžka rány.
Prontosan® gel na rány X by neměl být ve stálém kontaktu s ránou déle než 30 dní.

4. Tolerance tkání a biokompatibilita:
Dermatologicky testován a hodnocen jako nedráždivý a dobře tolerovaný, bezbolestný, neinhibuje granulaci a epitelizaci.

5. Nežádoucí účinky:
Ve velmi vzácných případech může po aplikaci přípravku Prontosan® k mírnému pocitu pálení, který

5. Vedlejší účinky:
Vo veľmi zriedkavých prípadoch pa so aplikácii produktu Prontosan® môže vyskytnúť strednе silný pocit pálenia, ktorý o niekoľko minút zmizne. Prontosan® môže spôsobiť alergické reakcie, ako je svrbenie (žihľavka) a vyrážky (exantém). V zriedkavých prípadoch (menej ako 1 z 10 000) boli v súvislosti s produktmi Prontosan® hlásený anafylaktický šok.

6. Kontraindikácie:
Prontosan® sa nesmie používať:
a) U pacientov so známou alergiou alebo ak existuje podozrenie, že pacient môže byť alergický na niektorú zložku produktu.
b) Na CNS a meningy.
c) V strednom a vo vnútornom uchu.
d) V očiach.
e) Na hyalínovú chrupavku a v aseptickej operaci kĺbov. Ak produkt Prontosan® príde do kontaktu s aseptickou chrupavkou, okamžite sa musí opláchnuť Ringerovým roztokom alebo bežným fyziologickým roztokom.
f) V kombinácii s aniónovými tenzidmi.
g) V kombinácii s čisticími mydlami, mastmi, olejmi, enzymy, atď. Tieto látky sa treba pred použitím z rany pečlivo odstrániť.

7. Obmedzenia použitia:
Obdobie tehotenstva a dojčenia: Neexistuje žiadny dôkaz mutagénnej alebo embryonálnej toxicity súvisiacej so zložkami tohto produktu. Pretože nedochádza k systémovej reabsorpcii polyhexanidu, prenos do materského mlieka je nepravdepodobný. Vzhľadom k nedostatku relevantných klinických skúšok a klinických skúseností s tehotnými a dojčiacimi ženami sa v týchto prípadoch Prontosan® Wound Gel X smie používať len po dôkladnom zvážení lekára.
Novorodenci a dojčatá: Kvôli nedostatku klinických údajov sa Prontosan® Wound Gel X smie u novorodencov a dojčiat používať selektívne a pod dôkladným lekárskym dohľadom.

8. Všeobecné bezpečnostné pokyny:
Len na externé použitie.
Neaplikujte pomocou infúzie ani injekcie.
Neprehĺtajte.
Ak sú tuby poškodené, nepoužívajte ich.
Fľaštičky uchovávajte mimo priameho slnečného svitu.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

9. Zhrnutie/technické informácie:
Prontosan® Wound Gel X je konzervovaný produkt, ktorý funguje ako trvalá antimikrobiálna bariéra. Tuba sa musí hneď po použití zatvoriť, aby nedošlo ku kontaminácii. Počas použitia sa musí vrch tuby chrániť pred kontamináciou. Tuby, ktoré prišli do priameho kontaktu s ranou alebo sa inak kontaminovali, by sa mali zlikvidovať.
Zloženie: purifikovaná voda, glycerol, hydroxyetylcelulóza, surfaktant betain, 0,1 % polyaminopropyl biguanid (polihexanid).
Tuby sú určené na použitie len pre jedného pacienta.
Skupenstvo a zápach: priehľadný, bezfarebný, vodný gél prakticky bez zápachu.
Skladovacia doba: 24 mesiacov, skladujte pri izbovej teplote.
Doba skladovania po prvom otvorení: 8 týždňov
Originálny spoj: Produkt po prvom otvorení už nie je sterilný.

DE Prontosan® Wundgel X

Gebrauchsanweisung für die Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen.

1. Einführung: Chronische Hautwunden sind häufig mit Schorf, nekrotischem Gewebe und/oder einem Biofilm bedeckt. Diese Beläge lassen sich nur schwer entfernen und führen zur verzögerten Wundheilung. Eine sachgemäße Wundreinigung ist daher äußerst wichtig. Durch die Anwendung von Prontosan® Wundgel X wird eine langfristige Reinigung und Dekontamination der Wunde zwischen Verbandswechseln ermöglicht.
Da akute Wunden allgemein mit Rückständen und Mikroorganismen verunreinigt sind, erfordern sie ebenfalls eine gründliche Reinigung. Diese Verunreinigungen können den normalen Wundheilungsprozess behindern und zu Komplikationen wie einer Infektion führen. Bei akuten traumatischen Wunden, die genäht werden müssen, wird Prontosan® Wundgel X nach der chirurgischen Versorgung und dem Setzen der Naht aufgetragen.
Durch die einzigartige Kombination der Inhaltsstoffe (d. h. die antimikrobielle Substanz Polihexanid und das Tensid Betain) eignet sich die Wundspüllösung Prontosan® optimal dafür, die Bildung eines Biofilms zu verhindern.

2. Produktprofil und Anwendungsbereiche:
Zur Reinigung, Befeuchtung und Dekontamination von:
a) akuten infizierten und nicht infizierten Wunden: traumatischen Wunden (wie z. B. Riesswunden, Schürfwunden oder Stichwunden – falls ein Nahtverschluss indiziert ist, sollte Prontosan® Wound Gel X erst nach dem chirurgischen Eingriff verwendet werden),
b) chronischen infizierten und nicht infizierten Wunden (inkl. komplexen, therapieresistenten Wunden, Wundtaschen, schwer zugänglichen Wunden).
c) postoperativen Wunden.
d) durch Hitze, chemische Substanzen und nach Strahlentherapie auftretenden Verbrennungen (1. bis 4. Grades).
e) Erfrierungen.

3. Allgemeine Anwendung:
Für optimale Resultate sollte zur Reinigung der Wunde und des sie umgebenden Hautbereichs Prontosan® Wundspüllösung verwendet werden, bevor dann der Auftrag von Prontosan® Wundgel X erfolgt.
Prontosan® Wundgel X sollte reichlich auf das Wundbett aufgetragen werden. Kavitäten und Taschen sind mit Prontosan® Wundgel zu füllen. Wundauflagen, Mullzuschnitte, Kompressen oder andere, absorptionsfähige Materialien können vor dem Legen des Verbands mit Prontosan® Wundgel X befeuchtet werden.
Prontosan® Wundgel X kann bis zum nächsten Verbandswechsel auf der Wunde belassen werden.
Je nach Häufigkeit des Verbandswechsels werden unterschiedliche Mengen Prontosan® Wundgel X aufgetragen. Die Wundoberfläche sollte kontinuierlich feucht gehalten werden, um eine ausreichende Reinigung und Desinfektion sicherzustellen. Ablagerungen werden mit dem nächsten Verbandswechsel sanft angelöst und entfernt. Der Auftrag sollte häufig genug vorgenommen werden, sodass alle Ablagerungen und nekrotischen Rückstände leicht entfernt werden können und das Wundbett optimal vorbereitet ist.
Prontosan® Wundgel X sollte nicht mehr als 30 aufeinanderfolgende Tage auf der Wunde verbleiben.

4. Gewebeverträglichkeit und biologische Kompatibilität:
Dermatologisch getestet und als nicht irritativ und gut

5. Nebenwirkungen:
In sehr seltenen Fällen kann nach Auftragen von Prontosan® ein leichtes Brennen auftreten, welches jedoch in der Regel nach wenigen Minuten wieder verschwindet. Prontosan® kann allergische Reaktionen wie Juckreiz (Urtikaria) und Hautausschläge (Exantheme) hervorrufen. Sehr selten (weniger als 1 Behandelter von 10.000 ist betroffen) wurde über anaphylaktische Schockreaktionen nach Verwendung von Prontosan® Produkten berichtet.

6. Gegenanzeigen:
Prontosan® sollte nicht angewendet werden:
a) bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe des Produkts.
b) im ZNS oder in den Meningen.
i) im Mittel- oder Innenohr.
j) im Auge.
e) auf hyalinem Knorpel und in der aseptischen Gelenkchirurgie. Sollte Prontosan® in Kontakt mit aseptischem Knor-pel gelangen, hat eine sofortige Spülung mit Ringer-Lösung oder isotonischer Kochsalzlösung zu erfolgen.
f) in Kombination mit anionischen Tensiden.
g) zusammen mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen usw. Diese Substanzen sind vor der Anwendung sorgfältig von der Wunde zu entfernen.

7. Anwendungsbeschränkungen:
Schwangerschaft und Stillzeit: Es gibt keine Nachweise für eine mit den Bestandteilen dieses Produkts verbundene mutagene oder Embryotoxität. Da keine systemische Wiederaufnahme von Polihexanid erfolgt, ist ein Übertritt in die Muttermilch unwahrscheinlich. Wegen der Mangels an relevanten klinischen Prüfungen und klinischer Erfahrung bei Schwangeren und Stillenden sollte bei diesen Personen die Anwendung von Prontosan® Wundgel X nur nach sorgfältiger medizinischer Konsultation erfolgen.
Neugeborene und Kleinkinder: Wegen des Mangels an klinischen Daten darf Prontosan® Wundgel X bei Neugeborenen und Kleinkindern nur in ausgewählten Fällen und unter engmaschiger medizinischer Überwachung angewendet werden.

8. Allgemeine Sicherheitshinweise:
Nur zur äußeren Anwendung. Nicht zur Injektion oder Infusion verwenden. Nicht einnehmen. Direkt beschädigter Tuben nicht verwenden. Flaschen vor direkter Sonnenbestrahlung schützen. Vor Kindern sicher aufbewahren.

9. Zusammenfassung/technische Angaben:
Prontosan® Wundgel X enthält Konservierungsmittel, und das Präparat bietet eine anhaltende antimikrobielle Barriere. Zur Vermeidung von Verunreinigungen ist die Tube unmittelbar nach dem Gebrauch zu verschließen. Während der Anwendung sollte der Offnung der Tube vor Verunreinigung geschützt werden. Tuben, die in direkten Kontakt mit der Wunde gekommen sind oder auf sonstige Weise verunreinigt wurden, müssen entsorgt werden. **Zusammensetzung:** Gereinigtes Wasser, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, Betain-Tensid, 0,1 % Polyaminopropylbiguanid (Polihexanid).
Tuben sind nur für die Anwendung bei einem Patienten vorgesehen. **Aussehen und Geruch:** klares, farb- und nahezu geruchloses wässriges Gel. **Haltbarkeit: 24** Monate. Bei Raumtemperatur lagern. **Haltbarkeit nach Anbruch:** 8 Wochen, **Originalitätssiegel:** Das Produkt ist nach dem ersten Öffnen nicht mehr steril.

CZ Prontosan® gel na rány X

Návod k použití na čištění, zvlhčování a dekontaminaci akutních, chronických a infikovaných kožních ran a popálenin.

1. Úvod:
Chronické kožní rány jsou často potaženy adherující, nekrotickou tkání a/nebo biofilmem. Tyto vrstvy se obtížně odstraňují a vedou k opožděnému hojení rány. Proto má řádné čištění ran zásadní význam. Použití přípravku Prontosan® gel X na rány zajišťuje dlouhodobé čištění a dekontaminaci lůžka rány mezi převazy.
Akutní rány rovněž vyžadují řádné čištění, protože jsou obvykle kontaminovány zbytky odumřelé tkáně a mikroorganismy. Tyto kontaminanty mohou narušovat proces normálního hojení rány a vést ke komplikacím, jako jsou infekce. Na akutní traumatické rány vyžadující šití se Prontosan® gel na rány X aplikuje po chirurgickém zákroku a šití.
Vzhledem k jedinečné kombinaci ingrediencí (tzn. antimikrobiální látky, polihexanidu a povrchově aktivní látky betainu) je Prontosan® ideální jako prevence tvorby biofilmu.

2. Profil výrobku a oblasti použití:
Pro čištění, zvlhčování a dekontaminaci:
a) akutních neinfikovaných a infikovaných ran: traumatické rány (např. tržné rány, odřeniny nebo bodné rány - je-li indikováno šití, měl by se Prontosan® Wound Gel X aplikovat až po chirurgickém zákroku),
b) chronických neinfikovaných a infikovaných ran (včetně komplikovaných, nepoddajných ran, dutin, obtížně se hojících ran).
c) Pooperačních ran.
d) Popálenin tepelných, chemických a po ozáření (1. – 4. stupně).
e) Omrzlin.

3. Všeobecné použití:
Pro dosažení optimálních výsledků je třeba použít Prontosan® roztok k irigaci rány (viz zvláštní informace k výrobku) k čištění rány a kůže okolo rány před léčbou přípravkem Prontosan® gel na rány X.
Prontosan® gel na rány X je třeba aplikovat na lůžko rány. Dutiny a kapsy je třeba vyplnit přípravkem Prontosan® gel na rány. Krytí na rány, gázy, kompresy a další absorpční prostředky k vyplnění rány lze před aplikací navlhčit přípravkem Prontosan® gel na rány X.
Prontosan® gel na rány X může na ráně zůstat až do příštího převazu.
Podle četnosti převazů se aplikují různá množství přípravku Prontosan® gel na rány X. Povrch rány by měl být udržován stále vlhký pro zajištění dostatečného čištění a dekontaminace. Povlaky se jemně uvolní a odstraní při následujícím převazu. Aplikaci je třeba provádět dostatečně často, aby byly pohůtové odstraněny všechny povlaky a nekrózy a pro optimální preparaci lůžka rány.
Prontosan® gel na rány X by neměl být v stálém kontaktu s ránou déle než 30 dní.

4. Tolerance tkání a biokompatibilita:
Dermatologicky testován a hodnocen jako nedráždivý a dobře tolerovaný, bezbolestný, neinhibuje granulaci a epitelizaci.

5. Nežádoucí účinky:
Ve velmi vzácných případech může po aplikaci přípravku Prontosan® k mírnému pocitu pálení, který

6. Kontraindikace:
Prontosan® by neměl být používán:
a) Pokud je známo či existuje podezření, že by pacient mohl být alergický na některou ze složek výrobku.
b) Na CNS nebo meningy.
c) Ve středním a vnitřním uchu.
d) V očích.
e) Na hyalinovou chrupavku a v aseptické operaci kloubu. Pokud Prontosan® přijde do styku s aseptickou chrupavkou, je třeba ji okamžitě irigovat Ringerovým roztokem nebo fyziologickým roztokem.
f) V kombinaci s aniontovými tenzidy.
g) V kombinaci s čisticími mýdly, mastmi, oleji, enzymy, atd. Tyto látky je třeba před použitím z rány pečlivě odstranit.

7. Omezení použití:
Těhotenství a kojení: Neexistují žádné důkazy o mutagenní toxicitě nebo toxicitě pro embryo ve spojení se složkami tohoto výrobku. Protože nedochází k systémové reabsorbci polihexanidu, přechod do mateřského mléka je nepravděpodobný. Vzhledem k nedostatku relevantních klinických hodnocení a klinických zkušeností s těhotnými a kojícími ženami je třeba Prontosan® gel na rány X v těchto případech používat pouze po pečlivé lékařské konzultaci.
Novorozenci a malé děti: Vzhledem k nedostatku údajů je třeba Prontosan® gel na rány X používat u novorozenců a malých dětí pouze selektivně a pod důsledným lékařským dozorem.

8. Všeobecné bezpečnostní pokyny:
Pouze k vnějšímu použití.
Nepoužívejte pro infuze nebo injekce.
Nepolykejte.
Nepoužívejte poškozené tuby.
Chraňte lahvičky před přímým slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

9. Souhrn/technické informace:
Prontosan® gel na rány X je konzervovaný výrobek, poskytující trvalou antimikrobiální bariéru. Tubu je třeba zavřít okamžitě po použití, aby se zamezilo kontaminaci. Vrch tuby je třeba při používání chránit před kontaminací. Tuby, které přišly do přímého styku s ránou nebo byly jinak kontaminovány je nutno zlikvidovat.
Složení: Purifikovaná voda, glycerin, hydroxyetylceluloza, povrchově aktivní látka betain, 0,1% polyaminopropyl biguanidin (polihexanid).
Tuby jsou určeny k použití pouze pro jednoho pacienta.
Vzhled a zápach: čirý bezbarvý hydrogel téměř bez zápachu.
Doba použitelnosti: 24 měsíců. Uchovávejte při pokojové teplotě.
Doba použitelnosti po prvním otevření: 8 týdnů
Originální uzávěr: Výrobek není po prvním otevření dále sterilní.

GB Prontosan® Wound Gel X

Instructions for use for cleansing, moistening and decontamination of acute, chronic and infected dermal wounds and burn.

1. Introduction:
Chronic skin wounds are often coated with slough, necrotic tissue and/or biofilm. These coatings are difficult to remove and lead to delayed wound healing. Therefore, proper wound cleansing is essential. The use of Prontosan® Wound Gel X provides long-lasting cleansing and decontamination of the wound bed between dressing changes.
Acute wounds also require proper cleansing as they are generally contaminated with debris and microorganisms. These contaminants can interfere with the normal wound healing process and lead to complications such as infection. For acute traumatic wounds that require suturing, Prontosan® Wound Gel X should be applied after surgical intervention and suturing.
Due to the unique combination of ingredients (i.e. the antimicrobial substance, polihexanide, and the surfactant, betaine), Prontosan® is ideal for the prevention of biofilm formation.

2. Product profile and areas of use:
For cleansing, moistening and decontamination of:
a) acute non-infected and infected wounds: traumatic wounds (such as lacerations, abrasions or stab wounds - if suturing is indicated Prontosan® Wound Gel X should be applied only after surgical intervention)
b) chronic non-infected and infected wounds (including complicated wounds, cavity wounds, difficult-to-access wounds.
c) postoperative wounds.
d) thermal, chemical and post-radiation therapy burns (1st–4th degree).
e) frostbites.

3. General use:
For optimal results, Prontosan® Wound Irrigation Solution (see separate product information) should be used for cleansing the wound and the skin the area around the wound prior to treatment with Prontosan® Wound Gel X.
Prontosan® Wound Gel X should be copiously applied to the wound bed. Cavities and pockets should be filled with Prontosan® Wound Gel necrosis. Dressings, gauzes, compresses or other absorbent wound fillers can be moistened with Prontosan® Wound Gel X before the dressing is applied.
Prontosan® Wound Gel X may remain on the wound until the next dressing change.
Depending on the frequency of dressing changes, varying amounts of Prontosan® Wound Gel X are applied. The surface of the wound should be kept continuously moist to ensure adequate cleansing and decontamination. Coatings are gently released and removed with the next dressing change. Application should be conducted frequently enough for all coatings and necroses to be readily removed and for optimal wound bed preparation.
Prontosan® Wound Gel X should not be in continual contact with the wound for longer than 30 days.

4. Tissue tolerability and biocompatibility:
Dermatologically tested and evaluated as non-irritating and well-tolerated; painless; no inhibition of granulation or epithelialisation.

5. Side effects:
In very rare cases, there may be a mild burning sensation after application of Prontosan®, but this usually dissipates after a few minutes. Prontosan® can cause allergic reactions such as itching (urticaria) and rashes (exanthema). In rare cases (less than 1 out of 10,000), anaphylactic shock has been reported with Prontosan® products.

6. Contraindications:
Prontosan® should not be used:
a) if the patient is known to be allergic or if it is suspected that the patient may be allergic to one of the ingredients of the product.
b) on the CNS or the meninges.
c) in the middle or inner ear.
d) in the eyes.
e) on hyaline cartilage and in aseptic joint surgery. If Prontos

ES Prontosan® Wound Gel X

Instrucciones de uso para la limpieza, hidratación y descontaminación de heridas crónicas, agudas, crónicas e infectadas, así como de quemaduras.

1. Introducción: A menudo las heridas crónicas de la piel aparecen recubiertas de esfacelo, tejido necrótico o biofilm, que se eliminan con dificultad, retrasando así la curación de la herida. Por lo tanto es fundamental lavar bien la herida. Prontosan® Wound Gel X proporciona una limpieza y descontaminación duraderas de la herida entre cambios de vendajes.

Las heridas agudas deben limpiarse adecuadamente porque normalmente se encuentran contaminadas con detritos y microorganismos. Estos elementos contaminantes interfieren en el proceso normal de curación de la herida, dando lugar a infecciones y complicaciones. En el caso de heridas traumáticas agudas que requieren sutura, Prontosan® Wound Gel X debe aplicarse después de la intervención quirúrgica y la sutura.

Gracias a la excepcional combinación de sus ingredientes (la sustancia antimicrobial, polihexanido y surfactante de betaína), Prontosan® es idóneo para evitar la formación de biofilm.

2. Perfil del producto y ámbitos de uso: Para limpieza, humidificación y descontaminación de:
a) heridas agudas infectadas y no infectadas: heridas traumáticas (tales como laceraciones de la piel, abrasiones o heridas quirúrgicas en las que, si es necesaria la sutura, se debe aplicar Prontosan® Wound Gel X después de la intervención quirúrgica);
b) heridas crónicas infectadas y no infectadas (incluidas las heridas complejas, recalcitrantes, cavitarias y de difícil acceso);
c) heridas postoperatorias;
d) quemaduras térmicas, químicas y derivadas de la terapia por radiación, de 1º a 4º grado);
e) congelación.

3. Uso general: Para obtener excelentes resultados, se debe utilizar Prontosan® Wound Irrigation Solution (ver información sobre el producto) para limpiar la herida antes de iniciar un tratamiento con Prontosan® Wound Gel X.

Prontosan® Wound Gel X debe aplicarse en abundance sobre la herida. Rellene con Prontosan® Wound Gel las cavidades y orificios. Antes de colocar el vendaje, humedezca con Prontosan® Wound Gel X las vendas, gasas, compresas u otro tipo de rellenos absorbentes para heridas.

Puede dejar Prontosan® Wound Gel X actuando sobre la herida hasta el siguiente cambio de vendaje. Según la frecuencia de cambios de los vendajes, se aplican diferentes cantidades de Prontosan® Wound Gel X. La superficie de la herida debe mantenerse húmeda continuamente para garantizar una adecuada limpieza y descontaminación. Con el siguiente cambio de vendaje se retira suavemente el recubrimiento. Para poder retirar fácilmente todos los recubrimientos y las necrosis, así como para obtener una buena preparación del lecho de la herida, deberá aplicarse el producto por lo menos 2 veces.

Prontosan® Wound Gel X no debe permanecer en contacto continuo con la herida durante más de 30 días.

4. Biocompatibilidad y tolerabilidad del tejido: Probado dermatológicamente, no irrita y se tolera bien; indoloro; no inhibe la granulación ni la epitelización.

5. Efectos secundarios: En casos excepcionales, al aplicar Prontosan® puede producirse una ligera sensación de escozor que desaparecerá en unos minutos. Prontosan® puede causar reacciones alérgicas, picazón (urticaria) y sarpullido (exantema). Aunque es poco frecuente (menos de 1 de cada 10.000), según informes se han producido choques anafilácticos con los productos Prontosan®.

6. Contraindicaciones:
No se debe utilizar Prontosan®:
a) si se sabe que el paciente es alérgico o si se sospecha que pueda ser alérgico a uno de los ingredientes del producto;
b) en el SNC o en las meninges;
c) en el oído medio u oído interno;
d) en los ojos;
e) en el cartílago hialino y en cirugía aséptica de las articulaciones. Si Prontosan® entra en contacto con el cartílago aséptico, deberá lavarse la zona inmediatamente con una solución Ringer o una solución salina normal.
f) en combinación con tensioactivos aniónicos.
g) en combinación con jabones de limpieza, ungüentos, aceites, enzimas, etc. Estas sustancias deben ser retiradas completamente de la herida antes de aplicar el producto.

7. Restricciones de uso: Embarazo y período de lactancia: No existe evidencia de toxicidad mutagénica ni embriónaria asociadas a los ingredientes de este producto. Al no existir reabsorción sistémica de polihexanidos, no es probable que se transmita a la leche materna. Debido a la falta de ensayos clínicos pertinentes y a la insuficiente experiencia clínica con embarazadas y mujeres lactantes, Prontosan® Wound Gel X sólo debe utilizarse tras una cuidadosa evaluación médica de dichos pacientes. **Niños y recién nacidos:** Debido a la falta de datos clínicos suficientes, en el caso de los niños y recién nacidos Prontosan® Wound Gel X sólo debe utilizarse de forma selectiva y bajo un estricto control médico.

8. Instrucciones de seguridad general: Sólo para uso externo. No utilizar para infusión o inyección. No ingerir. No utilice tubos que tengan desperfectos. Mantenga los envases lejos de la luz directa del sol. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

9. Resumen/Información técnica: Prontosan® Wound Gel X es un producto preservado que contiene una sustancia antimicrobial de forma continua. El tubo debe cerrarse inmediatamente después de su uso para evitar la contaminación del producto. Mientras se utiliza el tubo, debe evitarse que la punta entre en contacto con el mismo se contamine. Se deben desechar los tubos que hayan estado en contacto directo con la herida o que se hayan contaminado de otra manera. **Composición:** agua purificada, glicerol, hidroxietilcelulosa, surfactante de betaína, 0,1 % poliaminopropil biguanida (polihexanido). Cada tubo es exclusivo para un único paciente. **Aspecto y olor:** gel acuoso claro, incoloro y prácticamente inodoro. **Vida útil:** 24 meses; almacenado a temperatura ambiente. **Vida útil una vez abierto:** 8 semanas. **Sello de producto original:** una vez abierto el envase, el producto ya no está esterilizado.

HU Prontosan® X sebgél

Utasítások az akut, krónikus és fertőzött bőrsebek, illetve égési sebek tisztításához, nedvesítéséhez és fertőtlenítéséhez.

1. Bevezetés:
A krónikus bőrsérüléseket gyakran pörkös, elhalt szövet és/vagy biofilm réteg fedi. Ezeket a rétegeket nehéz eltávolítani, és a seb késleltetett gyógyulásához vezethet. Ezért a megfelelő sebtisztítás lényegesen fontos. A Prontosan® X sebgél használatával a sebünk köszönhetően közötti hosszan tartó tisztítása és fertőtlenítése érhető el.

Az akut sebek megfelelő tisztítást is igényelnek, mert általában törmelékkel és mikroorganizmusokkal szennyeződtek. Ezek a szennyeződések gátolják a szokásos sebgyógyulási folyamatot, és olyan komplikációkhoz vezethetnek, mint például a fertőzés. A varrást igénylő akut traumás sebek esetén a Prontosan® X sebgél a sebészeti beavatkozást és varrást követően kell alkalmazni.

Az összetevők egyedi kombinációjának köszönhetően (a polihexanid antimikrobiális anyag és a betain felületaktív anyag) a Prontosan® idealisan használható a biofilm létrejöttének megakadályozásához.

2. Termékprofil és felhasználási területek:
A következők tisztításához, öblítéséhez és fertőtlenítéséhez:
a) akut nem fertőzött és fertőzött sebek: traumás sebek (pl. felszakadások, horzsolások vagy szúrt sebek) - amennyiben varrás javallott, a Prontosan® X sebgél csak a sebészeti beavatkozást és varrást követően kell alkalmazni;
b) krónikus nem fertőzött és fertőzött sebek (pl. komplex, recalcitráns sebek, kavitás sebek, nehezen hozzáférhető sebek);
c) posztoperatív sebek;
d) hőterápia, illetve kémiai- és sugárterápia okozta (első–negyedfokú) égési sérülések;
e) fagysérülések.

3. Általános használat:
Az optimális eredmények érdekében a Prontosan® X sebgéllel végzett kezelés előtt a sebet a seb körüli bőrt a Prontosan® seblemosó oldattal (lásd a különálló termékjáratkoztatót) kell megtisztítani.
A Prontosan® X sebgél bőségesen kell alkalmazni a sebágyon. Az üregeket és a bemélyedéseket ki kell tölteni a Prontosan® sebgéllel. A kötés alkalmazása előtt a kötszerek, kötözőgézek, pólyák és egyéb abszorbens sebkitöltők a Prontosan® X sebgéllel nedvesíthetők.
A Prontosan® X sebgél a következő kötszercserig a seben maradhat.
A kötszercserék gyakoriságától függően különböző mennyiségű Prontosan® X sebgél alkalmazása javallott. A megfelelő tisztítás és fertőtlenítés érdekében a seb felületét folyamatosan nedvesen kell tartani. A fedőrétegeket a következő kötszercseréig óvatosan fel kell lazítani, és el kell távolítani. A készítmény megfelelő gyakorisággal kell alkalmazni az összes fedőréteg és elhalt szövet eltávolításához, valamint a sebágy optimális előkészítéséhez.
A Prontosan® X sebgél nem érintkezhet folyamatosan a sebben 30 napnál hosszabb ideig.

4. Szöveti tolerancia és biokompatibilitás: Bőrgyógyászatilag tesztelt és nem irritatívként és jól tolerálható értékelt; fájdalommentes; nem akadályozza a granulációt vagy az epithelializációt.

5. Mellékhatások:
Nagyon ritkán a Prontosan® alkalmazását követően enyhe égető érzés jelentkezhet, ez néhány percen után általában megszűnik. A Prontosan® allergiás reakciót válthat ki, így például viszketést (urticaria) és bőrkiütést (exanthema). Ritkán (10 000 betegből kevesebb mint 1 esetben), anaphylaxiás sokkot jelentettek a Prontosan® termékek alkalmazásakor.

6. Ellenjavallatok:
A Prontosan® alkalmazása ellenjavallt:
a) ha ismert vagy gyanított, hogy a beteg allergiás a termék valamely összetevőjére;
b) a központi idegrendszeren és az agyhártyán;
c) a közép- vagy belső fülön;
d) a szemeken;
e) a hialinporcon és aszeptikus üzületi műtéteknél – ha a Prontosan® érintkezik az aszeptikus porccal, azonnal le kell mosni Ringer oldattal vagy normál sóoldattal;
f) anionos felületaktív anyagokkal kombinálva;
g) tisztító szappanokkal, kenőcsökkel, olajokkal, enzimekkel stb. kombinálva – ezeket az anyagokat a használat előtt alaposan el kell távolítani a sebről;

7. Felhasználásra vonatkozó korlátozások:
Terhesség és szoptatás alatt: Nincs bizonyíték a jelen termék összetevőihez kapcsolódó mutagén vagy embrionális toxicitásra. Mivel a polihexanid szisztémás újrafelszívódása nem kerül sor, az anyatejbe való kiválasztódása nem valószínű. Mivel a terhes és szoptató nők esetében nem végeztek releváns klinikai vizsgálatokat, és nincs ezzel kapcsolatos klinikai tapasztalat, a Prontosan® X sebgél ilyen esetében csak alapos orvosi konzíliációt követően szabad használni.

Újszülöttek és csecsemők: Mivel nem áll rendelkezésre elegendő klinikai adat, a Prontosan® X sebgél csak szelektíven és szigorú orvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni újszülöttek és csecsemők esetében.

8. Általános biztonsági utasítások:
Kizárólag külső használatra.
Ne használja infúzióhoz vagy injekcióhoz.
Ne nyelje le.
Ne használjon megsérült csőveket.
Az üvegek közvetlen napfénytől távol tartandók.
A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

9. Összegzés és műszaki információk:
A Prontosan® X sebgél tartósított termék, amely tartós antimikrobiális gátat biztosít. A szennyeződés elkerülése érdekében a csövet a használat után azonnal le kell zárni. A cső tetejét a használat során védeni kell a szennyeződéssel szemben. Ki kell dobni azokat a csöveket, amelyek közvetlenül érintkeztek a sebbel vagy más módon szennyeződtek.
Összetétel: tisztított víz, glicerin, hidroxietil-cellulóz, betain felületaktív anyag, 0,1% poliaminopropil-biguanid (polihexanid).
A csövek kizárólag egy beteggel használhatók.
Külső megjelenés és szag: átlátszó, színtelen és gyakorlatilag szagtalan vizes gél.
Felhasználhatósági időtartam: 24 hónap; tárolja szobahőmérsékleten.
Felhasználhatósági időtartam az első kinyitás után: 8 hét
Eredetileg bezárott cső zár: A termék az első felnyitást követően többé nem steril.

IT Prontosan® Wound Gel X

Istruzioni d'uso per la detersione, idratazione e decontaminazione delle lesioni cutanee acute, croniche e infette e delle ustioni.

1. Introduzione:
Le ferite cutanee croniche sono spesso coperte da una crosta di tessuto necrotico o da biofilm. La rimozione di questi strati è difficoltosa e comporta un ritardo nella guarigione della ferita. Pertanto, un'appropriata pulizia della ferita è essenziale. L'utilizzo di Prontosan® Wound Gel X garantisce la pulizia e la decontaminazione durature del letto della ferita tra una medicazione l'altra.

Anche le ferite acute devono essere pulite appropriatamente in quanto sono generalmente contaminate da detriti cellulari e micro-organismi. Questi agenti contaminanti possono interferire con il normale processo di guarigione della ferita e portare a complicazioni, come ad esempio infezioni. In caso di ferite traumatiche acute che necessitano di sutura, Prontosan® Wound Gel X deve essere applicato dopo l'intervento chirurgico e la sutura.

Grazie alla speciale combinazione dei suoi ingredienti (sostanza antimicrobica, polieximide e il tensioattivo betaina), Prontosan® è ideale per prevenire la formazione di biofilm.

2. Profilo del prodotto e aree di utilizzo:
Per la detersione, idratazione e decontaminazione di:
a) lesioni acute non infette e infette: lesioni traumatiche (come lacerazioni, abrasioni o lesioni da taglio – se è necessario suturare, Prontosan® Wound Gel X deve essere applicato solo dopo l'intervento chirurgico);
b) lesioni croniche non infette e infette (comprese lesioni complesse e recalcitranti, lesioni in cavità, lesioni con accesso difficile);
c) ferite postoperatorie;
d) ustioni termiche, chimiche e post-radioterapia (ustioni dal 1° al 4° grado);
e) lesioni da congelamento.

3. Utilizzo generale:
Per ottenere risultati ottimali, si raccomanda di pulire la ferita e la cute circostante con la soluzione detergente per ferite Prontosan® (si vedano le informazioni di prodotto separate) prima di procedere con l'applicazione di Prontosan® Wound Gel X.
Applicare copiosamente Prontosan® Wound Gel X sul letto della ferita. Eventuali cavità e sacche devono essere riempite con Prontosan® Wound Gel. Medicazioni, garze, compresse e altri rienpitivi assorbenti per ferite possono essere impregnati con Prontosan® Wound Gel X prima di applicare la medicazione.
Prontosan® Wound Gel X può essere lasciato sulla ferita fino al successivo cambio di medicazione.
A seconda delle frequenza con cui la medicazione viene cambiata, si applicano quantitativi diversi di Prontosan® Wound Gel X. La superficie della ferita deve essere mantenuta costantemente umida per assicurare una pulizia e una decontaminazione adeguate. Gli strati si staccano con delicatezza e vengono rimossi con il successivo cambio della medicazione. L'applicazione deve essere eseguita con frequenza sufficiente a consentire la rimozione agevole di strati e cellule necrotiche e a garantire una preparazione ottimale del letto della ferita.
Prontosan® Wound Gel X non deve rimanere a contatto continuo con la ferita per oltre 30 giorni.

4. Tollerabilità tissutale e biocompatibilità: Dermatologicamente testato e risultato non irritante e ben tollerato; indolore; non inibisce la granulazione e l'epitelizzazione.

5. Effetti collaterali:
In casi molto rari, dopo l'applicazione di Prontosan® si può verificare un lieve bruciore che generalmente scompare dopo pochi minuti. Prontosan® può causare reazioni allergiche quali prurito (orticaria) ed eruzioni cutanee (esantemi). In rari casi (meno di 1 caso su 10.000) si è verificato shock anafilattico associato all'utilizzo dei prodotti Prontosan®.

6. Controindicazioni:
Prontosan® non deve essere utilizzato nei seguenti casi:
a) se il paziente è allergico o se si sospetta che sia allergico a uno dei componenti del prodotto;
b) sul SNC o sulle meningi;
c) nell'orecchio medio o interno;
d) negli occhi;
e) nella cartilagine ialina e negli interventi asettici sulle articolazioni. Se Prontosan® viene a contatto con la cartilagine asettica, occorre irrigare immediatamente con soluzione Ringer o con normale soluzione fisiologica;
f) in combinazione con tensioattivi anionici;
g) in combinazione con saponi, unguenti, oli, enzimi ecc. Prima dell'utilizzo di Prontosan® è necessario eliminare completamente tali sostanze dalla ferita.

7. Restrizioni di impiego:
Gravidanza e allattamento: non è nota alcuna attività mutagena o tossicità embrionale associata ai componenti di questo prodotto. Poiché non si verifica un riassorbimento sistemico del polieximide, la trasmissione nel latte materno è improbabile. Data la mancanza di sperimentazioni ed esperienze cliniche con donne in gravidanza e allattamento, Prontosan® Wound Gel X deve essere usato solamente dopo avere consultato un medico.
Neonati e lattanti: a causa degli scarsi dati clinici disponibili, Prontosan® Wound Gel X deve essere usato su neonati e lattanti esclusivamente nei casi di effettiva necessità e sotto la supervisione di un medico.

8. Istruzioni generali di sicurezza:
Solo per uso esterno. Non utilizzare per infusioni o iniezioni. Non ingerire. Non utilizzare se il tubetto è danneggiato. Tenere il flacone al riparo dalla luce solare diretta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

9. Riepilogo/informazioni tecniche:
Prontosan® Wound Gel X è un prodotto conservato che crea una durevole barriera antimicrobica. Per evitare contaminazioni, il tubetto deve essere chiuso immediatamente dopo l'utilizzo. Durante l'utilizzo, la parte superiore del tubetto deve essere protetta per evitare la contaminazione. I tubetti venuti a contatto diretto con la ferita o contaminati in altro modo devono essere eliminati.
Composizione: acqua depurata, glicerolo, idrossiletilcellulosa, tensioattivo betaina, poliaminopropil biguanide allo 0,1% (poliesanide).
Ciascun tubetto deve essere utilizzato per un solo paziente.
Aspetto e odore: gel acquoso trasparente, incolore e praticamente inodore. Durata: 24 mesi; conservare a temperatura ambiente. Durata dopo la prima apertura: 8 settimane. Sigillo di garanzia: il prodotto perde la sterilità dopo la prima apertura.

LT Gelis Prontosan® Wound Gel X

Instrukcijos, kaip valyti, drėkinti bei dekontaminuoti ūmines, lėtines ir infekuotas odos žaizdas bei nudegimus.

1. Įvadas:
Lėtinės odos žaizdos paprastai pasidengia šašais, nekroziniu audiniu ir (arba) biofilmu. Šių sluoksnių labai sunku pašalinti, jie gali lėtinti normalų žaizdos gijimą. Todėl labai svarbu kruopščiai žaizdas łaptuoti. Łaptuojant Prontosan® Wound Gel X® žaizdų gelį užtikrinamas ilgalaikis žaizdos dugno valymas ir dekontaminacija tarp tvarsčių keitimų.

Ūminės žaizdos taip pat būtinas tinkamas valymas, nes paprastai jos užterštos svetimkūniais ir mikroorganizmais. Šie teršalai gali sąlygoti normalų žaizdų gijimo procesą ir sukelti komplikacijų, pavyzdžiui, infekciją. Ūminės traumines žaizdas, kurias reikia siūti, „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų geliu reikėtų tepti po chirurginės operacijos ir siuvimo.

Dėl unikalaus ingredientų derinio (t. y. antimikrobinės medžiagos, polihexanido ir paviršinio aktyvumo priemonės betaino), „Prontosan®" idealiai apsaugo nuo biofilveliai susidarymo.

2. Produkto aprašas ir naudojimo sritys:
Valyti, drėkinti bei dekontaminuoti:
a) ūmines neinfekuotas ir infekuotas žaizdas, pvz., traumines žaizdas (įpjaustimus, įbrėžimus ar durtinės žaizdas, jei jos siuvamos, gelis „Prontosan® Wound Gel X" reikėtų tepti tik po chirurginės operacijos);
b) lėtines neinfekuotas ir infekuotas žaizdas (tarp jų sudėtingas, neįyjančias, gilias, sunkiai prieinamas žaizdas);
c) pooperacinės žaizdos;
d) terminiams, cheminių medžiagų ir po gydymo spinduliuotės atsiradusiems nudegimams (1-4 laipsnių);
e) nušalimams.

3. Įprastas naudojimas:
Siekiant optimalių rezultatų, prieš gydant „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelio žaizdą ir odą aplink ją reikia nuvalyti „Prontosan® " žaizdų valymo tirpalu (žr. atskirą produkto informacinį lapelį). Žaizdos dugną reikia gausiai patepti „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų geliu. Žaizdos ertmes ir kišenes reikia užpildyti „Prontosan®" žaizdų geliu. Prieš tvarstant žaizdą, tvarsčius, marles, kompresus ar kitokius žaizdos užpildus galima sudrėkinti „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų geliu.
„Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelį galima laikyti ant žaizdos iki kito tvarsčių keitimo.
Atsižvelgiant į tvarsčių keitimo dažnį tepamas nevienodas gelio „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelio kiekis. Norint užtikrinti tinkamą žaizdos valymą ir dekontaminaciją, žaizdos paviršių reikia nuolat išlaikyti drėgną. Šalas atsargiai nuimamas ir pašalinamas keičiant tvarsčius. Gelį reikia tepti pakankamai dažnai, kad pasišalintų visa nekrozinė medžiaga ir šalai, o žaizdos dugnas būtų gerai paruoštas.
„Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelio negalima tepti ant žaizdos be pertraukos ilgiau negu 30 dienų.

4. Audinių gebėjimas toleruoti ir biologinis suderinamumas:
Dermatologiškai ištirtas ir įvertintas kaip nedirginantis ir gerai toleruojamas; neskausmingas; netrikdo granuliacijos ir epitelizacijos procesų.

5. Šalutinis poveikis:
Labai retais atvejais užtepus „Prontosan®" juntamas nestipraus deginimas, tačiau paprastai jis greitu minutių jis pranyksta. „Prontosan®" gali sukelti alerginių reakcijų, pavyzdžiui, niežulį (dilgėlinę) ir bėrimą (egzantemą). Retais atvejais (mažiau negu 1 iš 10 000) nuodojant „Prontosan®" produktus pranešama apie patirtą anafilakinį šoką.

6. Kontraindikacijos:
„Prontosan® negalima naudoti:
a) jei pacientas yra alergiškas arba jeigu įtariama, kad jis gali būti alergiškas vienai iš produkto sudedamųjų dalių;
b) ant centrinės nervų sistemos arba smegenų dangalų;
c) ant vidinės arba vidinėje ausyje;
d) akyse;
e) ant hialininių kremzlių ir aseptinių sąnarių operacijų vietose. Jei „Prontosan®" patenka ant aseptinės kremzlės, ji reikia nedelsiant nuplauti Ringerio arba įprastiniu fiziologiniu tirpalu.
f) kartu su anjoniniais paviršinio aktyvumo medžiagomis;
g) kartu su valymo muilais, tepalais, aliejais, fermentais ir pan. Prieš naudojimą šias medžiagas reikia kruopščiai pašalinti.

7. Naudojimo apribojimai:
Nėštumo ir žindymo laikotarpiu: nėra produkto sudėtinių dalių mutageninio ar embriotoksiško poveikio įrodymų. Kadangi nėra polihexanido sisteminės reabsorbcijos, jo perdavimas per motinos pieną mažai tikėtinas. Tačiau dėl susijusių klinikinių tyrimų stokos ir nepakankamos klinikinės nėščių ir krūtimi maitinančių motinų gydymo patirties „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelį šiems pacientams reikėtų skirti tik po nuodugnių medicininių konsultacijų.
Naujagimiai ir kūdikiai: dėl nepakankamų klinikinių duomenų „Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelį naujagimiams ir kūdikiams reikėtų skirti tik atrankos būdu ir atidžiai prižiūrint gydytojams.

8. Bendrieji saugos nurodymai:
Tik išorinio naudojimo. Nenaudoti infuzijoms ar injekcijoms. Nenuryti. Nenaudoti pažeistų tūbelių. Buteliukus laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. Saugoti nuo vaikų.

9. Santrauka / techninė informacija:
„Prontosan® Wound Gel X" žaizdų gelis yra konserviuotas produktas, užtikrinantis ilgalaikį antimikrobinį barjerą. Iškart po naudojimo tūbelė turi būti uždaroma, kad būtų apsaugota nuo užteršimo. Naudojimo metu tūbelės viršus turi būti saugomas nuo užteršimo. Tūbelės, kurios prisilietė tiesioginė prie žaizdos arba buvo užterštos kitu būdu, reikia išmesti.
Sudėtis: išgrynintasis vanduo, glicerolis, hidroksietiloceliuliozė, betainas paviršinio aktyvumo medžiaga, 0,1 % poliamino-propilo biguanido (polihexanido). Tūbelės yra skirtos naudoti tik vienam pacientui.
Išvaizda ir kvapas: skaidrus, bespalvis ir faktiškai be kvapo vandeninis gelis.
Galiojimo terminas: 24 mėnesiai; laikyti kambario temperatūroje.
Galiojimo terminas po pirmojo atidarymo: 8 savaitės. Originalumo plomba: atidarius pirmą kartą, produktas praranda sterilumą.

PL Prontosan® Wound Gel X

Instrukcje czyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ostrych, przewlekłych i zakażonych ran, a także oparzeń.

1. Wprowadzenie:
Przewlekłe rany skóry pokryte są często lepką, martwiczą tkanką /lub biofilmem. Powłoki takie są trudne do usunięcia, a ich obecność prowadzi do wydłużenia procesu gojenia się rany. Z tego względu odpowiednie czyszczenie rany ma zasadnicze znaczenie.

Zastosowanie żelu na rany Prontosan® Gel X zapewnia długotrwały efekt czyszczący i odkażający błyska rany pomiędzy zmianami opatrunków.

Ostre rany także wymagają odpowiedniego czyszczenia, ponieważ są zwykle zanieczyszczone brudem i mikroorganizmami. Zanieczyszczenia takie mogą zakłócać prawidłowy proces gojenia się i prowadzić do powikłań, takich jak infekcje. W przypadku ran powstałych w wyniku urazu i wymagających zastosowania szwów żel na rany Prontosan® Gel X należy zastosować po zabiegu chirurgicznym i założeniu szwów.

Dzięki niepowtarzalnemu składowi (tzn. substancji przeciwdrobnoustrojowej, polihexanidyjnie i substancji powierzchniowej — betainie), Prontosan® Gel X jest idealnym środkiem zapobiegającym powstawaniu biofilmu.

2. Profil produktu i obszar zastosowania:
Do czyszczenia, nawilżania i dekontaminacji:
a) niezakażonych i zakażonych ran ostrych: rany urazowe (takie jak rany szarpane, otarcia, czy rany kłute, - jeżeli wskazane jest założenie szwów, Prontosan® Wound Gel X należy zastosować dopiero po zabiegu chirurgicznym);
b) niezakażonych i zakażonych ran przewlekłych (w tym ran złożonych, uporczywych w leczeniu, ran jamistych, ran trudno dostępnych);
c) ran pooperacyjnych;
d) oparzeń cieplnych, chemicznych i radiacyjnych (1–4 stopnia);
e) odmrożeń.

3. Ogólny sposób stosowania:
Aby uzyskać optymalne wyniki, przed zastosowaniem żelu na rany Prontosan® Gel X należy użyć roztworu do płukania ran Prontosan® (patrz odrębną informację o produkcie) do oczyszczenia rany i skóry wokół rany. Żel na rany Prontosan® Gel X należy obficie nałożyć na łożysko rany. Zagłębienia i uchyłki należy wypełnić żelem na rany Prontosan® Gel X. Opatrunki, gaze, kompresy lub inne wchłaniające materiały wypełniające ranę można przed założeniem opatrunku zwilżyć żelem na rany Prontosan® Gel X. Żel na rany Prontosan® Gel X może pozostawać na ranie aż do następnej zmiany opatrunku. Zależnie od częstotliwości zmian opatrunków stosuje się różne ilości żelu na rany Prontosan® Gel X.
Powierzchnię rany należy utrzymywać stale zwilżoną, co zapewni jej odpowiednie oczyszczenie i odkażenie. Przy zmianie opatrunku, zużyte opatrunki odchodzą od rany delikatnie i łatwo. Aplikację żelu należy przeprowadzać dostatecznie często, aby wszelkie powłoki i tkanki martwicze były szykko usuwane, co zapewni optymalne przygotowanie łożyska rany.
Żel na rany Prontosan® Gel X nie powinien pozostawać w nieprzerwanym kontakcie z raną przez okres przekraczający 30 dni.

4. Tolerancja i zgodność biologiczna z tkankami: Żel został poddany badaniom dermatologicznym i stwierdzono, że nie ma działania podrażniającego i jest dobrze tolerowany; nie powoduje bólu; nie hamuje procesu granulacji zachodzącego w gojącej się ranie.

5. Działania uboczne:
W bardzo rzadkich przypadkach po zastosowaniu środka Prontosan® Gel X może wystąpić łagodne uczucie pieczenia, lecz ustępuje ono samoistnie w czasie kilku minut. Produkty Prontosan® mogą wywoływać reakcje alergiczne, takie jak swędzenie (pokrzywka) i wysypka. W rzadkich przypadkach (poniżej 1 na 10 000) dochodziło do wstrząsu anafilaktycznego po zastosowaniu produktu Prontosan®.

6. Przeciwwskazania:
Środka Prontosan® Gel X nie należy stosować:
a) jeśli pacjent jest uczulony lub istnieje podejrzenie, że pacjent może być uczulony na którykolwiek składnik produktu;
b) na CUN lub opony mózgowo-rdzeniowe;
c) w uchu środkowym lub wewnętrznym;
d) na oczy;
e) na chrząstkę szklistą oraz w aseptycznych zabiegach chirurgicznych stawów. Jeśli produkt Prontosan® Gel X zetknie się z aseptyczną chrząstką, należy go niezwłocznie spłukać roztworem Ringera lub solą fizjologiczną;
f) w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi;
g) w połączeniu z mydłami, maściami, olejkami, enzymami i podobnymi środkami czyszczącymi. Substancje te należy dokładnie usunąć z rany przez użyciem produktu.

7. Ograniczenia dotyczące stosowania:
Okres ciąży i laktacji: Nie ma dowodów na mutagenne lub toksyczne dla płodu działanie składników tego produktu. Z uwagi na brak wchłaniania polihexanidyny przez organizm jego przedostawanie się do mleka matki jest mało prawdopodobne. Ze względu na brak właściwych badań klinicznych i doświadczeń klinicznych stosowania produktu u kobiet w ciąży i karmiących piersią, w takich przypadkach jeł na rany Prontosan® Gel X powinien być stosowany po konsultacji medycznej.

Noworodki i niemowlęta: Ze względu na niewystarczające dane kliniczne żel na rany Prontosan® Gel X może być stosowany u noworodków i niemowląt wyłącznie i pod ścisłym nadzorem medycznym.

8. Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:
Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie stosować do infuzji ani iniekcji.
Nie połykać. Nie stosować, jeśli tubka jest uszkodzona. Chronić buteleк przed bezpośrednim światłem słonecznym. Trzymać przed dziećmi.

9. Podsumowanie/informacje techniczne:
Żel na rany Prontosan® Gel X jest konserwowanym produktem zapewniającym trwałą barierę przeciwdrobnoustrojową.
Tubkę należy zamknąć niezwłocznie po użyciu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia jej zawartości. Podczas stosowania należy chronić szczyt tubki przed zanieczyszczeniem. Tubkę, która miała bezpośredni kontakt z raną lub została zanieczyszczona w inny sposób, należy usunąć. **Skład:** Woda oczyszczona, glicerol, hydroksyetyloceluloza, powierzchniowo czynna betaina, 0,1% roztwór poliamino-propiloguanidyny (polihexanidyny). Tubka może być stosowana wyłącznie u jednego pacjenta. Postać i woń: przezroczysty, bezbarwny i bezwonny żel wodny. Okres ważności: 24 miesiące; przechowywać w temperaturze pokojowej. Trwałość po pierwszym otwarciu: 8 tygodni
Plomba: Po pierwszym otwarciu produkt nie jest już jałowy.

NL Prontosan® wondgel X

Gebruiksaanwijzing voor het reinigen, bevochtigen en ontsmetten van acute, chronische en geïnfecteerde huid- en brandwonden.

1. Inleiding: Chronische huidwonden zijn vaak bedekt met dood, necrotisch weefsel en/of een biofilm. Deze zijn moeilijk te verwijderen en zorgen voor een vertraagd genezingsproces. Daarom is de juiste wondreiniging van wezenlijk belang. Het gebruik van Prontosan® wondgel X biedt een langdurige reinigende en decontaminatie van het wondbed tussen de verbandwisselingen.

Acute wonden vereisen ook een goede reiniging omdat zij over het algemeen zijn verontreinigd met vuilresten en micro-organismen. Deze verontreinigingen kunnen het normale wondgenezingsproces belemmeren en leiden tot complicaties, zoals infecties. Voor acute traumatische wonden die moeten worden gehecht, moet Prontosan® wondgel X worden aangebracht na de chirurgische ingreep en hechting.

Dankzij de unieke combinatie van bestanddelen (bijv. de antimicrobiële stof polyhexanide, en de oppervlakte-actieve stof, betaine), is Prontosan® ideaal om de vorming van biofilm te voorkomen.

2. Productprofiel en toepassingsgebieden:
Voor het reinigen, bevochtigen en ontsmetten van:
a) acute niet-geïnfecteerde en geïnfecteerde wonden: traumatische wonden (zoals laceraties, schaaf- of steekwonden. Als er genaaid moet worden, moet Prontosan® Wound Gel X pas na de chirurgische ingreep worden aangebracht);
b) chronische niet-geïnfecteerde en geïnfecteerde wonden (waaronder complexe, hardnekkige wonden, holtewonden, moeilijk toegankelijke wonden);
c) postoperatieve wonden.
d) thermische en chemische brandwonden en brandwonden na een bestralingstherapie (1e- en –4e-graad).
e) bevriezingen.

3. Algemeen gebruik: Voor optimale resultaten moet Prontosan® oplossing voor wondirrigatie (raadpleeg de productinformatie) gebruikt worden gebruikt voor de reiniging van de wond en de huidzone rond de wond, vóór de behandeling met Prontosan® wondgel X.
Prontosan® wondgel X moet overvloedig op het wondbed worden aangebracht. Holten en zakken moeten worden gevuld met Prontosan® wondgel. Verbanden, gaas, kompressen of andere absorberende wondvullers kunnen worden bevochtigd met Prontosan® wondgel X voordat het verband wordt aangebracht.
Prontosan® wondgel X kan op de wond zitten tot de volgende verbandwisseling.
Afhankelijk van de frequentie van de verbandwisselingen worden variërende hoeveelheden Prontosan® wondgel X aangebracht. Het oppervlak van de wond moet continu vochtig worden gehouden om een adequate reiniging en ontsmet-ting te verzekeren. Wondbeslag wordt bij de volgende verbandwisseling voorzichtig losgemaakt en verwijderd. Dit moet vaak genoeg worden gedaan zodat al het wondbeslag en de necroses gemakkelijk kunnen worden verwijderd, en voor de optimale preparatie van het wondbed.
Prontosan® wondgel X mag niet langer dan 30 dagen permanent in contact zijn met de wonde.

4. Weefseltolerantie en biocompatibiliteit: Dermatologisch getest en beoordeeld als niet-irriterend en goed verdraagbaar; pijnloos; geen remming van de granulatie of epithelialisatie.

5. Bijwerkingen: In zeer zeldzame gevallen kan er een mild branding gevoel optreden na aanbrenging van Prontosan®, maar dit verdwijnt gewoonlijk na enkele minuten. Prontosan® kan allergische reacties veroorzaken zoals jeuk (neteltoren) en uitslag (exanthem). In zeldzame gevallen (minder dan 1 op 10.000) is een anafylactische shock gerapporteerd bij Prontosan® producten.

6. Contra-indicaties:
Prontosan® mag niet worden gebruikt:
a) als bekend is dat de patiënt allergisch is of als de patiënt vermoedelijk allergisch is voor een van de bestanddelen van het product;
b) op het CZS of de hersenvliezen.
c) in het midden- of binnenoor.
d) in de ogen.
e) op hyalien-kraakbeen en bij een aseptische gewrichtsoperatie. Als Prontosan® in contact komt met aseptisch kraakbeen, moet dit onmiddellijk worden geïrrigeerd met een ringeroplossing of een normale fysiologische zoutoplossing.
f) in combinatie met anionische tensiden.
g) in combinate met reinigingszeepen, zalven, oliën, enzymen, etc. Deze stoffen moeten voor het gebruik grondig van de wonde worden verwijderd.

7. Gebruiksbeperkingen: Zwangerschap en lactatieve periode: Er is geen bewijs voor mutagenic