

Sanum

Quentakehl® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium glabrum e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Penicillium glabrum e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5 aquos. dil. (HAB, Vorschrift 5b). Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2x wöchentlich 1 ml s.c. injizieren.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Quentakehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium glabrum ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: <ul style="list-style-type: none"> • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium glabrum). • Autoimmunerkrankungen • Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	

Wechselwirkungen: Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Quentakehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.

Vorsichtsmaßnahmen: Keine bekannt.

Dauer der Behandlung:

Handelsform: 1/10/50 Ampullen à 1 ml.