



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

SALBEITEE

1,5 g / Aufgussbeutel

Arzneitee zum Einnehmen sowie zur Anwendung in der Mundhöhle nach Bereitung eines Teeaufgusses, für Erwachsene

Wirkstoff: Salbeetriebspitzen, geschnitten

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Salbeitee und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Salbeitee beachten?
3. Wie ist Salbeitee anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Salbeitee aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Salbeitee und wofür wird er angewendet?

Salbeitee ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel, das

Innerlich angewendet wird zur

Linderung von leichten Magen-Darm-Beschwerden wie zum Beispiel Sodbrennen und Blähungen, sowie zur Linderung von übermäßigem Schwitzen;

Lokal angewendet wird zur

Linderung von Entzündungen in Mund und Rachen.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Salbeitee beachten?

Salbeitee darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen Salbei sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Salbeitee ist erforderlich, wenn die unter Abschnitt 1 beschriebenen Beschwerden verstärkt auftreten. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Arzt oder Apotheker. Der Anwender sollte bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren. Teeaufgüsse sollen grundsätzlich mit kochendem Wasser zubereitet werden. Eine Zubereitung von Tee mit warmem Wasser ist nicht ausreichend.

Kinder und Jugendliche

Aufgrund unzureichender Daten wird die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht empfohlen.

Anwendung von Salbeitee zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden. Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt. Untersuchungen zu Wechselwirkungen wurden mit Salbeitee nicht durchgeführt.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft und Stillzeit: Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Salbeitee nicht empfohlen.

Fortpflanzungsfähigkeit: Es liegen keine Daten zur Untersuchung des Einflusses von Salbeitee auf die Fortpflanzungsfähigkeit vor.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Bisher liegen keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor. Entsprechende Untersuchungen wurden mit Salbeitee nicht durchgeführt.

3. Wie ist Salbeitee anzuwenden?

Wenden Sie Salbeitee immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung für Erwachsene und Senioren

Soweit nicht anders verordnet, wird Salbeitee folgendermaßen angewendet: 1 Aufgussbeutel Salbeitee wird mit 150 ml siedendem Wasser übergossen und bedeckt etwa 10 Minuten ziehen gelassen. Bei innerlicher Anwendung wird bis zu 3-mal täglich 1 Tasse warmer Teeaufguss getrunken. Bei lokaler Anwendung im Mund- und Rachenbereich wird bis zu 3-mal täglich mit dem noch warmen Teeaufguss gespült und gegurgelt. Personen mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen: Für Personen mit eingeschränkter Nierenfunktion / Leberfunktion gilt die oben genannte Dosierung ohne Änderung.

Dauer der Anwendung

Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden

Wenn die Beschwerden länger als 2 Wochen anhalten (oder sich verschlimmern) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei übermäßiger Schweißsekretion

Längere Anwendung ist möglich (siehe auch Abschnitt 2, Unterabschnitt "Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen"). Wenn die Beschwerden sich innerhalb von 6 Wochen nicht gebessert haben, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Entzündungen in Mund und Rachen

Wenn die Beschwerden länger als 1 Woche anhalten (oder sich verschlimmern) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wenn Sie eine größere Menge des Arzneimittels angewendet haben, als Sie sollten

Wenn sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch Salbeitee Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Salbeitee aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf. Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen. Nicht über 25 °C lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Salbeitee enthält

1 Aufgussbeutel (= 1,5 g) Arzneitee enthält den Wirkstoff: 1,5 g Salbeetriebspitzen, geschnitten. Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Wie Salbeitee aussieht und Inhalt der Packung

Originalpackung mit 20 einzeln verpackten Filterbeuteln à 1,5 g.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170
01705 Freital
Deutschland

Telefon: +49 351 65803-0

Fax: +49 351 65803-99

E-Mail: info@bombastus-werke.de

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2024.