

SANFERIN[®]

schützt natürlich!



INFORMATION
FÜR VERBRAUCHER

Es wurde Ihnen der Verzehr von SanFerIn®-Tabletten empfohlen, da Sie von den Inhaltsstoffen Lactoferrin, Lysozym, EGCG und Mannose profitieren können.



LACTOFERRIN ist ein Eiweiß, welches in hoher Konzentration in der Muttermilch vorkommt und für das gestillte Neugeborene eine hohe Schutzwirkung gegen Bakterien, Viren und verschiedene Pilze entfaltet. Lactoferrin kommt im gesamten Organismus vor, wird z.B. von Schleimhäuten gebildet und dient hier ebenfalls dazu, Bakterien, Viren und verschiedene Pilze abzuwehren. Gewonnen wird das in SanFerIn® enthaltene Lactoferrin aus Kuhmilch.



LYSOZYM, auch als Muramidase bekannt, ist ein Enzym, das auch eine wichtige Schutzfunktion etwa für Schleimhäute hat. Lysozym kann die Wand von bestimmten Bakterien auflösen und dadurch vor Bakterien schützen. Da Lysozym im Hühnerei in höheren Konzentrationen vorkommt, wird das in SanFerIn® enthaltene Lysozym daraus gewonnen.

Lactoferrin und Lysozym sind in den meisten – wenn nicht in allen – Körperflüssigkeiten einschließlich Blut, Urin, Schweiß, Tränen, Speichel, Magensaft, Darmsekret, Vaginalsekret und Nasensekret vorhanden, sie bilden hier einen Teil des angeborenen Immunsystems.



GRÜNTÉE enthält **EGCG** (Epigallocatechingallat), eine besonders wertvolle Substanz, die zur Gruppe der Catechine gehört und die verschiedene Zellen des menschlichen Körpers positiv beeinflusst. Als wirksames Antioxidans kann EGCG Zellen vor Sauerstoffradikalen schützen und so Krankheiten, im Besonderen Entzündungen vorbeugen.



MANNOSE ist ein in der Natur weitverbreiteter Zucker, der entweder in gebundener Form als Mehrfachzucker oder in einfacher Form vorliegt. Nach Einnahme hilft er mit, die Harnwege beim Menschen gesund zu erhalten. Mannose kommt unter anderem in Äpfeln, Pfirsichen, Beeren wie Preiselbeeren und deren Kulturform, der Moosbeere (Cranberry), vor.



Sanferin® schützt natürlich vor Keimen, die die Gesundheit beeinträchtigen!



Aufgrund der Zusammensetzung können SanFerIn® Tabletten eingesetzt werden bei:

- Personen, welche zu wiederholten Infektionen der oberen Atemwege oder der unteren Harnwege neigen,
- Personen, die wiederholt zu Hautunreinheiten unter Bildung von Pickeln und Eiterbläschen (Pusteln) neigen,
- Personen, bei denen das Immunsystem geschwächt ist,
- Personen, die Antibiotika einnehmen.

Wie sollen SanFerIn® Tabletten eingenommen werden?

Erwachsene und Kinder ab dem 10. Lebensjahr:
Die ersten zwei Tage: 2 x 3 Tabletten (6 Tabletten) pro Tag,
in weiterer Folge: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag

Kinder zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr:
Die ersten zwei Tage: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag,
in weiterer Folge: 2 x 1 Tablette (2 Tabletten) pro Tag

Die Tabletten mit reichlich Flüssigkeit vor oder zu einer Mahlzeit einnehmen.

Wann sollen SanFerIn® Tabletten nicht eingenommen werden?

SanFerIn® Tabletten sind in der Regel gut verträglich, lediglich Personen mit Hühnereiallergie ist von der Einnahme abzuraten, da Lysozym von Hühnereiern gewonnen wird. Deshalb sollten auch Kinder zwischen dem 6. und dem 10. Lebensjahr SanFerIn® Tabletten dann nicht einnehmen, wenn eine Hühnereiallergie nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Bei einer zusätzlichen Einnahme von SanFerIn® Tabletten mit Antibiotika sollte die Einnahme mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Lactosefrei, glutenfrei, zuckerfrei und farbstofffrei!

PRODUKTBESCHREIBUNG

1 Tablette SanFerIN® enthält:

Lactoferrin	50 mg
Lysozym	20 mg
Grüntee-Extrakt*)	100 mg
Mannose	150 mg
Zink	2 mg

*) enthält Epigallocatechingallat (EGCG)

Lactosefrei, glutenfrei, zuckerfrei und farbstofffrei!

Zutaten:

D-Mannose, Grüntee-Extrakt, Lactoferrin, Lysozym-HCl, Zinksulfat,
Füllstoffe: Cellulose, Hydroxypropylcellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose,
Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren;
Überzug: Hydroxypropylmethylcellulose, Talkum.



Packungsgrößen:

SanFerIN® Tabletten zu 20 Stk. und 40 Stk.

Das Verfalldatum auf der Außenverpackung und am Tablettenblistert beachten.
Nach Ablauf nicht mehr anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern.

Weitere Auskünfte zu SanFerIN® Tabletten können Sie anfordern: