

Sanum

Sanukehl® Pseu D6 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Bakterienpräparate
Wirkstoff:	Pseudomonas aeruginosa extractum e volumine cellulae (lyophil., steril.) D6
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Pseudomonas aeruginosa extractum e volumine cellulae (lyophil., steril.) D6 Dil. (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
In der Naturheilkunde dokumentierte Anwendungsgebiete:	
Anwendung:	Zum Einnehmen: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5-10 Tropfen alle 12 bis 24 Stunden ein. Bei chronischen Verlaufsformen werden 10 Tropfen alle 2 Tage eingenommen. Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren nehmen bei akuten Krankheitszuständen vor einer Mahlzeit 5 Tropfen alle 12-24 Stunden ein, bei chronischen Verlaufsformen werden 5 Tropfen alle 2 Tage eingenommen. Zum Einreiben in die Haut: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Alle 1-2 Tage werden 5-10 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum eingerieben. Kinder ab 6 bis unter 12 Jahren: Alle 1-2 Tage werden 5 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum

eingerieben.

Kinder ab 2 bis unter 6 Jahren: Alle 1-2 Tage werden höchstens 5 Tropfen in die Ellenbeugen oder um den Nabel herum eingerieben. Die allgemeine Empfehlung zur Dosierung ist 1 Tropfen pro Lebensjahr.

Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Sanukehl® Pseu D6 abgesetzt werden.

Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Sanukehl® Pseu D6 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber <i>Pseudomonas aeruginosa</i> • Autoimmunerkrankungen • Kindern unter 2 Jahren • Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Sanukehl® Pseu D6 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	10 ml Tropfflasche 10x 10 ml Bündelpackung.