

# Sanum

## Sanuvis® D1 Salbe



Darreichungsform:	Salbe zum Einreiben
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum L(+)-lacticum D1
Zusammensetzung:	1 g Salbe enthält: 0,10 g Acidum L(+)-lacticum D1 dil. (HAB, Vorschrift 5a, D1 mit gereinigtem Wasser). Sonstige Bestandteile: 0,38 g Wollwachsalkoholsalbe, 0,10 g Mittelkettige Tryglyceride, 0,03 g Glycerolmonostearat 40-55, 0,23 g Propylenglycol, 0,02 g Magnesiumsulfat · 7 H <sub>2</sub> O, 0,14 g Wasser für Injektionszwecke.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3 x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt; siehe Vorsichtsmaßnahmen.
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb

bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Cetylstearylalkohol (Bestandteil der Wollwachsalkoholsalbe) kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann ebenfalls Hautreizungen hervorrufen.

---

Zusatzhinweis:

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform:

Tube mit 30 g,  
Bündelpackung mit 10x 30 g