

# Sanum

## Sanuvis® Flüssige Verdünnung zur Injektion



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darreichungsform:               | Flüssige Verdünnung zur Injektion                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Präparatgruppe:                 | Präparate aus physiologischen Carbonsäuren                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wirkstoff:                      | Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12/D30/D200 Potenzakkord                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zusammensetzung:                | 2 ml enthalten:<br>0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D4 aquos. (HAB, V. 5b),<br>0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D6 aquos. (HAB, V. 5b),<br>0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D12 aquos. (HAB, V. 5b),<br>0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D30 aquos. (HAB, V. 5b),<br>0,4 ml Acidum L(+)-lacticum D200 aquos. (HAB, V. 5b). |
| Erfahrungsgemäß angewendet bei: | Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.                                                                                                                                                                                                        |
| Anwendung:                      | Erwachsene und Kinder aller Altersgruppen 1-3x wöchentlich 2 ml i.m. injizieren.                                                                                                                                                                                                                       |
| Nebenwirkungen:                 | Keine bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gegenanzeigen:                  | Keine bekannt; siehe Vorsichtsmaßnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unerwünschte Reaktionen:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wechselwirkungen:               | Keine bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vorsichtsmaßnahmen:             | Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Sanuvis® in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.                                                                                                                                   |
| Zusatzhinweis:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

Dauer der Behandlung:

---

Handelsform:

10/50 Ampullen à 2 ml,  
Bündelpackung 10x 50 Ampullen à 2 ml.