


Suprasorb® A + Ag

Antimikrobieller Calciumalginat-Verband



- 1 überschüssiges Exsudat aus der Wunde wird im Verband aufgenommen
- 2 Gelbildung durch Ionenaustausch
- 3 Abtötung der Bakterien durch freigesetzte Silberionen

Anwendungsbereiche

- stark exsudierende Wunden
- oberflächliche oder tiefe Wunden
- infektgefährdete Wunden
- infizierte Wunden
- in der Exsudations- und Granulationsphase, z. B.:
 - Ulzera verschiedener Genese
 - Verbrennungen 2. Grades
 - Spalthautentnahmestellen
 - postoperative Wunden
 - fungale Läsionen

Eigenschaften

- schnelle und breite antimikrobielle Wirksamkeit, auch gegen MRSA und VRE
- sehr gute Wundheilung durch hohes Exsudataufnahmevermögen
- gute Anschließbarkeit an jeden Wundgrund (schnelle Gelbildung)
- hohe Sicherheit durch Reduzierung der mikrobiellen Last am Wundgrund und Bindung im Gel

Hinweise

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Infektionsstatus, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen

Bitte bei Infektion beachten: okklusiver Sekundärverband nur nach Entscheidung des Arztes, abhängig von der Gesamtsituation.

Ausführungen

- Komresse
- Tamponade

Tipp

- kann mit folgenden Sekundärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb P, Vliwasorb, Vliwazell und Vliwin

Suprasorb® A + Ag Antimikrobieller Calciumalginat-Verband
steril, einzeln eingeschiegelt

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)	Verordnungshinweise
Komresse				
5 x 5	121 902	740 217 3	8 / 80	SSB, EV
10 x 10	121 903	740 219 6	8 / 40	SSB, EV
10 x 20	20 572	482 953 4	5 / 20	SSB, EV
Tamponade				
30 cm, 2 g	20 573	482 954 0	5 / 20	SSB, EV

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15