Lohmann & Rauscher

# Suprasorb® C

## Kollagen-Wundverband




1 schnelle Exsudataufnahme und Gelbildung; wundheilungshemmende Faktoren werden im Verband gebunden
2 zugeführtes Kollagen aktiviert die Wundheilung und schützt Wachstumsfaktoren

**Anwendungsbereiche**

- zum Auflegen auf Wunden bei Verletzungen mit größeren oberflächlichen Gewebsdefekten, z. B.
  - Brandwunden
  - operativen Gewebsdefekten
  - Ulcera verschiedener Genese und Wundhöhlen, vor allem wenn nach Behandlung mit anderen Wundverbänden stagnierende Wundverhältnisse vorgefunden werden

**Eigenschaften**

- beschleunigt aktiv die Wundheilung
- bindet wundheilungshemmende Faktoren (z. B. Proteasen, Radikale, Zytokine)
- schützt Wachstumsfaktoren
- schnelle Exsudataufnahme durch ausgeprägte Porenstruktur

**Hinweise**

Verbandwechselintervall:

- wird durch den behandelnden Arzt je nach Wundzustand, Exsudationsgrad und Sekundärverband festgelegt, spätestens nach 5 - 7 Tagen
- bei schwach exsudierenden Wunden empfiehlt es sich, Suprasorb C mit NaCl oder Ringerlösung anzufeuchten

**Tipp**

- kann mit folgenden Sekundärverbänden kombiniert werden, z. B.: Suprasorb X, Suprasorb P, Suprasorb H, Suprasorb F, Suprasorb G Amorphes Gel

**Suprasorb® C** Kollagen-Wundverband
steril, einzeln eingesiegelt

| Größe (cm) | REF | PZN | VE (Stk.) | Verordnungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 6 x 0,8 | 20 481 | 043 313 0 | 5 / 225 | EV |
| 6 x 8 x 0,8 | 20 482 | 043 314 7 | 5 / 180 | EV |
| 8 x 12 x 0,8 | 20 483 | 043 315 3 | 5 / 90 | EV |

Erläuterung Verordnungs- und Erstattungshinweise siehe S. 15