

VIVIDRIN® DEINE ANTWORT AUF ALLERGIEN

BAUSCH + LOMB

Vividrin® Azelastin EDO®

0,5 mg / ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis



Linderung im Fall der Fälle: Unsere Akuthilfe für gereizte Augen bei Heuschnupfen

Blütenpollen, Hausstaubmilben, Tierhaare oder andere körperfremde Substanzen können allergische Reaktionen wie brennende, tränende oder juckende Augen verursachen. Vividrin® Azelastin EDO® wirken minuten-schnell und zuverlässig gegen akute Beschwerden am Auge ohne müde zu machen. Das gut verträgliche Arzneimittel mit dem bewährten Wirkstoff Azelastin hilft sowohl bei saisonalen allergischen Symptomen am Auge wie z. B. Heuschnupfen als auch bei nicht saisonaler allergischer Bindehautentzündung (Konjunktivitis).

Bei starken, plötzlichen Beschwerden

Bei Allergien schütten Mastzellen vermehrt den Entzündungsbotenstoff Histamin aus und lösen damit eine Immunreaktion aus. Der gut verträgliche Wirkstoff Azelastinhydrochlorid wirkt dreifach gegen die Beschwerden: Er hemmt die Histamin-Rezeptoren und reduziert allergische Symptome wie z.B. Juckreiz oder Rötungen der Augen. Gleichzeitig werden die Mastzellen stabilisiert und die Freisetzung von Histamin gemindert. Zusätzlich wirkt Azelastin antientzündlich.²

Produkt auf einen Blick

- Akute Behandlung plötzlich auftretender Symptome
- Gute Verträglichkeit (ohne Konservierungsstoffe!)
- Langanhaltende Wirkung von bis zu 24 Stunden bei 2 x täglicher Anwendung¹
- Lange Haltbarkeit – auch bei geöffneter Faltschachtel*
- 3-facher Wirkmechanismus²
- Für Erwachsene und Kinder³

¹ Friedlaender M., et al. Ophthalmology. 2000; 107:2152-57

² Horak F. & Ziegelmayer UP. Expert Rev. Clin. Immunol. 2009;5(6):659-69


³ Bei saisonaler allergischer Konjunktivitis für Kindern ab 4 Jahren; nicht-saisonal (perennial) ab 12 Jahren: Fachinformation Vividrin® Azelastin EDO® (Stand August 2021)

* Haltbarkeit 24 Monate. Jedes Tropfbehältnis sollte nur einmal benutzt und nach Anwendung verworfen werden.


ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Trennen Sie vorsichtig ein Einzeldosisbehältnis vom Streifen ab (Abbildung 1). Drehen (nicht ziehen) Sie die Verschlusskappe ab (Abbildung 2). Neigen Sie den Kopf nach hinten. Ziehen Sie das untere Augenlid vorsichtig nach unten. Setzen Sie vorsichtig einen Tropfen in die Mitte des Unterlids. Achten Sie darauf, mit dem Tropfbehältnis nicht das Auge zu berühren, um eine Verunreinigung des Tropfbehältnisses zu vermeiden (Abbildung 3).


Lassen Sie Ihr unteres Augenlid los und drücken Sie sanft auf den inneren Augenwinkel gegen den Nasenrücken. Halten Sie Ihren Finger gegen die Nase gedrückt und blinzeln Sie langsam einige Male mit den Augen, um den Tropfen über die Augenoberfläche zu verteilen.



1




2



3

Kontaktlinsen vor dem Tropfen entnehmen und nach 15 min wieder einsetzen.



BEI HEUSCHNUPFEN

Eine Überempfindlichkeit gegen Blüten- und Gräserpollen löst häufig geschwollene, gerötete oder juckende Augen aus. Vividrin® Azelastin EDO® können bei akuten Symptomen innerhalb weniger Minuten langanhaltend und zuverlässig wirken ohne müde zu machen³.

ALLERGIEN

Unzählige Auslöser machen der empfindlichen Bindehaut zu schaffen: Allergien gegen Hausstaubmilben, Tierhaare oder Schimmelpilzsporen verursachen unangenehme Beschwerden wie Brennen und Juckreiz. Ein Antiallergikum wie Vividrin® Azelastin EDO® kann die Symptome wirksam und schnell bekämpfen.

KONTAKTLINSENTRÄGER

Grundsätzlich sollte bei allergischer Bindehautentzündung der Augenarzt befragt werden, ob weiterhin Kontaktlinsen getragen werden dürfen. Ist dies gestattet, sind harte und weiche Kontaktlinsen vor dem Eintropfen herauszunehmen und frühestens 15 Min. danach wieder einzusetzen.

FÜR KINDER

Auch Kinder sind häufig von einer allergisch bedingten Bindehautentzündung betroffen. Aufgrund der guten Verträglichkeit und schnellen Wirkung sind Vividrin® Azelastin EDO® bei saisonalen Allergien bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet³.

HÄUFIGE FRAGEN & ANTWORTEN

Wie lange können Vividrin® Azelastin EDO® angewendet werden?

Während einer Belastung mit Allergenen (Gräser- und Blütenpollen, Hausstaub, etc.) sollten Vividrin® Azelastin EDO® regelmäßig angewendet werden, bis die Beschwerden verschwunden sind. Insgesamt sollte die Behandlung ohne ärztliche Rücksprache nicht länger als sechs Wochen andauern.

Wie oft muss ich Vividrin® Azelastin EDO® anwenden?

Im Falle einer saisonal allergischen Bindehautentzündung ist die empfohlene Dosis – soweit nicht ärztlich anders verordnet – bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren 2x täglich 1 Tropfen in jedes Auge. Die Anwendung kann bei Bedarf auf 4 x täglich erhöht werden.

Bei einer nicht-saisonalen allergischen Bindehautentzündung geben Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 2x täglich 1 Tropfen Vividrin® Azelastin EDO® in jedes Auge. Die Anwendung kann bei Bedarf auf 4x täglich erhöht werden.

Was passiert, wenn ich die Behandlung mit Vividrin® Azelastin EDO® abbreche?

Vividrin® Azelastin EDO® sollten möglichst regelmäßig angewendet werden, bis die Beschwerden verschwunden sind. Bei einer Unterbrechung der Anwendung können die Beschwerden – falls Sie weiterhin Allergenen ausgesetzt sind – erneut auftreten.

Vividrin® Azelastin EDO® 0,5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis Wirkstoff: Azelastinhydrochlorid. **Anwendungsgebiete:** Vividrin® Azelastin EDO® wird angewendet zur: - Behandlung und Vorbeugung von durch Heuschnupfen bedingten Beschwerden am Auge (saisonale allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 4 Jahren. - Behandlung von durch Allergien auf Substanzen wie zum Beispiel Hausstaubmilben und Tierhaare bedingten Beschwerden am Auge (nicht-saisonale (perenniale) allergische Konjunktivitis) bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren. Vividrin® Azelastin EDO® ist nicht zur Behandlung von Infektionen des Auges geeignet. **Warnhinweise:** Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Packungsbeilage beachten. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irland. Im Mitvertrieb: Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, E-Mail: kontakt@bausch.com (Stand: August 2021)