

# Vulniphane® Vaginalgel

 Dr. Pfleger  
ARZNEIMITTEL

Feuchtigkeitsspendendes Gel mit 0,3 % Hyaluronsäure und Milchsäure  
zur Anwendung in der Scheide und im äußeren Intimbereich.



Gebrauchsanweisung, bitte sorgfältig lesen und beachten.

Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

## Was ist Vulniphane® Vaginalgel und wie ist es zusammengesetzt?

Vulniphane® ist ein farbloses Gel zur Befeuchtung der Scheide und Linderung von durch Scheidentrocknen hervorgerufenen Beschwerden wie Juckreiz, Brennen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Vulniphane® enthält keine Hormone.

Vulniphane® enthält Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Kaliumsorbit, Milchsäure, Natriumchlorid, 0,3% Natrium-Hyaluronat, Propylenglycol, gereinigtes Wasser und Xanthangummi.

Das Vaginalgel ist frei von Duft- und Farbstoffen, sowie Parabenen

## Wann sollten Sie Vulniphane® Vaginalgel anwenden?

Vulniphane® wird angewendet zur Linderung und Vorbeugung von Beschwerden, die durch Trockenheit in der Scheide und im äußeren Intimbereich hervorgerufen werden. Scheidentrocknen verursacht häufig Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.

Die Symptome der Scheidentrocknen können die Lebensqualität der betroffenen Frauen stark beeinträchtigen. Vielfach ist durch diese Beschwerden auch der Geschlechtsverkehr unangenehm oder sogar schmerhaft. Vulniphane® Vaginalgel kann diese Beschwerden lindern und zur Erleichterung des Geschlechtsverkehrs angewendet werden.

Besonders betroffen sind Frauen in den Wechseljahren und in den Jahren danach. Ursache der Beschwerden in diesen Fällen ist eine abnehmende Produktion von Sexualhormonen (u. a. Östrogen). In der Scheide wird weniger Scheidenflüssigkeit produziert, die Haut wird dünner und verletzlicher. Auch nach Operationen an der Gebärmutter oder an den Eierstöcken, während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie unter der Einnahme der „Pille“ können hormonelle Veränderungen zum Beschwerdebild der Scheidentrocknen führen. Ebenso können manche Stoffwechsel-Erkrankungen (z.B. Diabetes), bestimmte Medikamente, Bestrahlungsbehandlungen bei Tumorerkrankungen oder auch psychische Belastungen Scheidentrocknen verursachen.

## Wie wirkt Vulniphane® Vaginalgel?

Das Vaginalgel bildet auf den betroffenen trockenen Stellen einen schützenden Film und sorgt mit wasserbindenden Substanzen (z.B. Hyaluronsäure) für eine anhaltende Befeuchtung in der Scheide und im Bereich des Scheideneingangs.

Durch den Gehalt an Milchsäure unterstützt Vulniphane® zusätzlich die Aufrechterhaltung des natürlich sauren pH-Wertes (3,8 – 4,5) in der Scheide und trägt so zum Schutz der Scheidenflora bei.

## Was müssen Sie bei der Anwendung von Vulniphane® Vaginalgel beachten?

### Vulniphane® darf nicht angewendet werden:

- bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber einem der Inhaltsstoffe

- bei Vorliegen einer Scheideninfektion (z. B. Scheidenpilz). Bitte sprechen Sie diesbezüglich mit Ihrem Arzt.

### Holen Sie ärztlichen Rat ein bei:

- stärker ausgeprägten Beschwerden durch Trockenheit vor Anwendung von Vulniphane®
- anhaltenden oder wiederkehrenden Beschwerden unter Anwendung von Vulniphane®
- sich verschlimmernenden vaginalen Beschwerden unter Anwendung von Vulniphane®

Ob und inwieweit Vulniphane® die Wirkung von vaginal verwendeten Verhütungsmitteln beeinträchtigen kann, ist nicht bekannt. Ebenso ist nicht bekannt, ob bei gleichzeitiger Anwendung von Vulniphane® und Kondomen die Reißfestigkeit der Kondome und dadurch deren Schutzwirkung beeinträchtigt wird.

Vulniphane® enthält keinen Wirkstoff der männliche Samen (Spermien) abtötet und schützt deshalb nicht vor ungewollter Schwangerschaft.

### Nebenwirkungen

Nach dem Auftragen des Gels kann in seltenen Fällen vorübergehend ein leichtes Brennen auftreten. Falls diese Reaktion bei sehr trockener, empfindlicher Vaginalschleimhaut länger bestehen bleibt, sollten Sie Vulniphane® nicht weiterverwenden. Wenn Sie andere unangenehme Wirkungen beobachten, sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit Vulniphane® Vaginalgel auf tretenen schwerwiegenden Vorkommnisse an den Hersteller und an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Im Falle einer Beschädigung der Tube oder einer Veränderung der Beschaffenheit des Vaginalgels verwenden Sie das Produkt nicht und informieren Sie den Hersteller.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Vulniphane® sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt angewendet werden.

## Wie wenden Sie Vulniphane® Vaginalgel an?

Vulniphane® ist zur Anwendung in der Scheide und im äußeren Genitalbereich bestimmt. Bitte waschen Sie sich vor jeder Anwendung des Vaginalgels gründlich die Hände (20 -30 Sek. mit Seife) und achten Sie auf Hygiene im Intimbereich.

### Vor dem ersten Gebrauch:

Schrauben Sie vor dem ersten Gebrauch der Tube die Verschlusskappe ab und drücken Sie diese umgedreht auf die Tubenöffnung, um den Membranverschluss zu öffnen.

Bei Beschwerden im Scheideneingang und im äußeren Intimbereich wird das Gel je nach Bedarf, auch mehrmals täglich, mit einem sauberen Finger aufgetragen und verteilt. Hierfür reicht ein Gelstrang von ca. 0,5 cm Länge aus.

**Die Anwendung in der Scheide** sollte einmal täglich, vorzugsweise abends vor dem Zubettgehen, erfolgen. Führen Sie einen Gelstrang von ca. 2 cm Länge mit einem sauberen Finger ein und verteilen Sie das Gel in der Scheide. Verwenden Sie, wenn nötig, einen Wäscheschutz.

Nach Besserung der Beschwerden kann die Anwendungshäufigkeit je nach Bedarf herabgesetzt werden.

#### Wie lange sollten Sie Vulniphan® Vaginalgel anwenden?

Bei akuten Symptomen sollte eine tägliche Anwendung über 7 -maximal 10 Tage erfolgen. Nach dem Abklingen der Symptome genügt zur Aufrechterhaltung der Befeuchtung eine Anwendung jeden 3. Tag bzw. eine Anwendung bei Bedarf.

#### Wie lange ist Vulniphan® Vaginalgel haltbar?

Vulniphan® darf nur bis zu dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum verwendet werden.

 Das Verfalldatum ist jeweils nach dem Symbol angegeben und bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

 Nach Anbruch ist das Gel über einen Zeitraum von 6 Monaten haltbar.



#### Hersteller:

Gynial GmbH  
Ungargasse 37/4/1  
1030 Wien  
Österreich  
Tel: +43 (0)1 890 14 54  
Fax: +43 (0)1 890 14 54-15  
info@gynial.com  
www.gynial.com



#### Vertrieb Deutschland:

Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH,  
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 12,  
96052 Bamberg, Deutschland  
Telefon: 0951/6043-0,  
Telefax: 0951/604329.  
E-Mail: info@dr-pfleger.de

#### Stand der Information

Oktober 2024

#### Wie ist Vulniphan® Vaginalgel aufzubewahren?

 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
 Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Packungsgröße von Vulniphan® Vaginalgel

Tube mit 5 ml (unverkäufliches Muster) und 30 ml Gel.

**MD** Medizinprodukt

**UDI** Produktidentifizierung (UDI-Datenträger)

**LOT** Chargenbezeichnung

**CE** 0483

 Temperaturgrenzwerte

 Verwendbar bis

 Haltbarkeit nach der Öffnung

250975

001

pal\_DE-0288\_20241022



**Dr. Pfleger**  
ARZNEIMITTEL