

Wobe-Mucos

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Packung 120 Tbl. (63 g) PZN: 11181068

Packung 360 Tbl. (190 g) PZN: 11181074

Ein Produkt der:

MUCOS Pharma GmbH & Co. KG
D-13509 Berlin

Zusammensetzung

| Nährstoffe | Pro 100 g | Pro 6 Tabl. | Pro 12 Tabl. |
|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Brennwert (kJ / kcal) | 1028 / 251 | 31 / 8 | 62 / 16 |
| Fett, | 1,9 g | 0,06 g | 0,12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,04 g | 0,08 g |
| Kohlenhydrate, | < 0,2 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
| davon Zucker | < 0,2 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
| Eiweiß | 24 g | 0,7 g | 1,4 g |
| Salz (davon Natrium) | 0,36 g (142 mg) | 0,01 g (4 mg) | 0,02 g (8 mg) |
| Papain (Papaya) | 10 g | 324 mg | 648 mg |
| Trypsin (Rind, Schwein) | 11 g | 348 mg | 696 mg |
| Chymotrypsin (Rind) | 5,7 g | 180 mg | 360 mg |

Mindestens 1500 F.I.P. Einheiten pro Tablette

Zutaten:

Füllstoff Cellulose; Papain (enthält **Sulfite**); Trypsin; Chymotrypsin; Füllstoff Hydroxypropylcellulose; Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid; Cocosöl; Überzugsmittel Natriumalginat, Ethylcellulose und Fettsäuren.

Verwendungshinweise:

Zum Diätmanagement bei onkologischen Patienten während und nach einer Chemo- und/oder Strahlentherapie.

Während einer Chemo- und/oder Strahlentherapie sollen täglich 3 x 4 Tabletten Wobe-Mucos® verzehrt werden. Nach Abschluss der Chemo- und/oder Strahlentherapie kann der Verzehr auf 3 x 2 Tabletten täglich reduziert werden.

Tabletten mit reichlich Flüssigkeit (Wasser) unzerkaut einnehmen. Einnahme mindestens 30 Minuten vor oder mindestens 90 Minuten nach einer Mahlzeit.