

Araniforce®-T

Tabletten

Muskel / Gelenke

Homöopathisches Komplexmittel (Potenzen)

Registriertes homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoffe (1 Tablette enthält):		Monographien	Ergänzende Symptomauswahl
Acidum silicicum Trit. D6	30,00 mg	Chron. Entzündungen und Gewebschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke	Gelenkschmerzen, Steifigkeit der Glieder
Alchemilla vulgaris Trit. D6	30,00 mg	(Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Entzündliche Prozesse)	
Calcium carbonicum Hahnemanni Trit. D6	30,00 mg	Kalziumstoffwechselstörungen	Rheumatische Schmerzen in Knochen und Gelenken
Calcium phosphoricum Trit. D6	30,00 mg	Wirbelsäulenerkrankung, Kalziummangelzustände	Rückenschwäche, rheumatische Gelenkschmerzen
Equisetum arvense (HAB 34) Trit. D6 (HAB V2a)	30,00 mg	(Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Niere, entzündliche Prozesse)	Ilio-Sacralschmerzen
Ilex aquifolium (HAB 34) Trit. D6 (HAB V2a)	30,00 mg	(Literatur: Wirkungsrichtung der Pharmakologie entsprechend: Entzündliche Prozesse)	
Symphytum (HAB 34) Trit. D6 (HAB V3a)	30,00 mg	Knochen und Knochenhautverletzungen	Rheumatische und traumatische Knochenschmerzen
Anwendungsgebiete	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.		
Gegenanzeigen	Keine bekannt.		
Vorsichtsmaßnahmen	Bei Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt, bei Kindern unter 12 Jahren nicht anwenden.		
Warnhinweis	Dieses Arzneimittel enthält Lactose.		
Nebenwirkungen	Keine bekannt.		
Wechselwirkungen	Keine bekannt.		
Dosierung	Soweit nicht anders verordnet, 1-3 x täglich je 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren		
Packungsgröße	100 Tabletten		