

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Thrombocutan® 30.000 Salbe N**

Wirkstoff: Heparin-Natrium 30.000 I.E./100 g Salbe

mibe

mibe GmbH
 Arzneimittel
 Münchener Straße 15
 06796 Brehna
 Tel.: 034954/247-0
 Fax: 034954/247-100

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich.

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Thrombocutan 30.000 Salbe N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

- 1. Was ist Thrombocutan 30.000 Salbe N und wofür wird es angewendet?**
- 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Thrombocutan 30.000 Salbe N beachten?**
- 3. Wie ist Thrombocutan 30.000 Salbe N anzuwenden?**
- 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**
- 5. Wie ist Thrombocutan 30.000 Salbe N aufzubewahren?**
- 6. Weitere Informationen**

1. WAS IST THROMBOCUTAN 30.000 SALBE N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Thrombocutan 30.000 Salbe N ist ein Arzneimittel zur Verminderung von Schwellungen.

Thrombocutan 30.000 Salbe N wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen, Blutergüssen).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON THROMBOCUTAN 30.000 SALBE N BEACHTEN?

Thrombocutan 30.000 Salbe N darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Heparin-Natrium, Soja, Erdnuss, oder einen der sonstigen Bestandteile von Thrombocutan 30.000 Salbe N sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Thrombocutan 30.000 Salbe N ist erforderlich

Thrombocutan 30.000 Salbe N soll nicht auf Schleimhäute, offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

Bei Anwendung von Thrombocutan 30.000 Salbe N mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben.

Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Thrombocutan 30.000 Salbe N

Cetylstearylalkohol, Sorbinsäure und Kaliumsorbat können örtlich begrenzte Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. WIE IST THROMBOCUTAN 30.000 SALBE N ANZUWENDEN?

Wenden Sie Thrombocutan 30.000 Salbe N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Thrombocutan 30.000 Salbe N soll 2–3mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Nach der Anwendung sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.

Dauer der Anwendung

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt. Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Thrombocutan 30.000 Salbe N ca. 1–2 Wochen anwenden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Thrombocutan 30.000 Salbe N zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Thrombocutan 30.000 Salbe N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind selten.

Jedoch können sehr selten allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

Beim Auftragen auf Schleimhäute ist aufgrund des Gehaltes an Propylenglykol lokale Reizung möglich.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.

Sojalecithin kann sehr selten allergische Reaktionen hervorrufen.

Gegenmaßnahmen

Thrombocutan 30.000 Salbe N sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST THROMBOCUTAN 30.000 SALBE N AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel nach <Verw. bis> angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch
Nach Anbruch der Tube ist die Salbe 6 Monate verwendbar.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Thrombocutan 30.000 Salbe N enthält

Der Wirkstoff ist Heparin-Natrium.

100 g enthalten 0,2 g Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein), entsprechend 30.000 I.E.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Wasser, Emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Mittelkettige Triglyceride, Oleyloleat, Propylenglykol, Levomenthol, Sorbinsäure, Kaliumsorbat, Citronensäure-Monohydrat, Palmitoylascorbinsäure (Ph.Eur.), all-rac- α -Tocopherol, Sojalecithin, Natriumedetat (Ph.Eur.).

Wie Thrombocutan 30.000 Salbe N aussieht und Inhalt der Packung

Thrombocutan 30.000 Salbe N ist eine weiße bis hellgelbe, homogene Salbe. Sie ist in Originalpackungen mit 100 g Salbe (N2) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Str. 15

06796 Brehna

Tel.: 034954/247-0

Fax: 034954/247-100

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2009.



 kroha GmbH D- 39179 Barleben	VOU009	E- Mail: SatzBA@Kroha.de Tel.: +49-(0)3 92 03-9 51-34
Kunde: Mibe GmbH		Farbigkeit: 1/1-farbig
bitte zu Händen: Frau Lünse		schwarz
Ihre Ident-Nummer: G01472-01		
Produktformat in mm: 148 x 290		
Auftr.-Nr. letzter Korr.: A 316812		
1. Korrekturabzug		
		Mit freundlichen Grüßen i.A. Thomas Fiedler

 kroha GmbH D- 39179 Barleben	Fax: +49-(0)3 92 03-9 51-30 ISDN: +49-(0)3 92 03-9 51-39	DS0004
Wir bitten Sie, diesen Korrekturabzug nach sorgfältiger Prüfung mit dem Manuskript zurückzugeben oder zurückzufaxen. Für nicht berichtigte Fehler übernehmen wir keine Verantwortung. Der Abzug ist für Druckausführung, Format und Bedruckstoff nicht maßgebend.		
☒ druckreif		
☐ nach Korrektur druckreif	02.09.2009	<i>Chlöse</i>
☐ nach Korrektur neuen Abzug	Datum	Unterschrift