zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

TIRO-CYL® L

Ho-Len-Complex

Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 10,7 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Arsenicum album Dil. D6	1,50 g
Arsenum jodatum Dil. D8	1,50 g
Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D12	1,50 g
Chininum arsenicosum Dil. D6	1,50 g
Lachesis Dil. D12	1,50 g
Lycopus virginicus Dil. D3	1,25 g
Pulsatilla Dil. D6	1,25 g

(1 g entspricht 23 Tropfen)

Darreichungsform und Inhalt:
Originalpackung mit 30 ml / 50 ml / 100 ml Mischung

Indikationsgruppe:
Homöopathisches Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:
Pharma Liebermann GmbH
Hauptstr. 27
D- 89423 Gundelfingen/Donau
Telefon: (09073) 95 893-0
Telefax: (09073) 95 893-55

Anwendungsgebiete:
Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Sollten die Beschwerden während der Behandlung anhalten, sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht anwenden?
Nicht anwenden bei Chininüberempfindlichkeit sowie bei Alkoholkranken.
Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Wann dürfen Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?
Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.
Bei Leberkranken ist die Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?
Zur Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Warnhinweis:
Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® enthält 50,4 Vol.% Alkohol !

Wechselwirkungen
Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung
Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da sonst Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® nicht richtig wirken kann !

Wieviel und wie oft sollten Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?
Soweit nicht anders verordnet:
1-3 mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Wie und wann sollten Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?
Die Tropfen sollte man am besten unverdünnt oder mit wenig Wasser einnehmen und einige Zeit im Mund belassen.

Wie lange sollten Sie Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® anwenden?
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen
Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tiro-cyl® L Ho-Len-Complex® auftreten?
Bisher sind keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Hinweis:
Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels
Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Etikett sowie auf der Faltschachtel aufgedruckt.
Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum !

Stand der Information:
Oktober 2004

Reg.-Nr. 2522451.00.00

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011