

octenidol® md

Gebrauchsfertige Lösung zur Dekontamination des Mund- und Rachenraums durch physikalische Reinigung und zur unterstützenden Wundbehandlung von Läsionen im Mundraum.

Unser Plus

- zur MRE-Dekontamination
- keine Verfärbung der Zähne[1]
- chlorhexidinfrei

Anwendungsgebiete

Das Medizinprodukt octenidol® md Mundspüllösung sorgt für eine gründliche Reinigung des Mund- und Rachenraums, insbesondere schwer zugängliche Stellen wie Zahnfleischtaschen oder Zahnzwischenräume werden gut erreicht. octenidol® md Mundspüllösung löst und entfernt durch die enthaltenen Inhaltsstoffe Belege und Keime und trägt somit zu einer effektiven MRE-Dekontamination bei.

Anwendungshinweise

Soweit nicht anders verordnet den Mund zwei bis drei mal täglich mit ca. 10 - 15 ml der unverdünnten Mundspüllösung für mindestens 30 Sekunden gründlich spülen oder im Rachen gurgeln. Die Mundspüllösung wird danach ausgespuckt. Aus hygienischen Gründen bitte mit dem beiliegenden Applikationsbecher anwenden und diesen nach Gebrauch reinigen.

CE 0499

octenidol® md

Produktdaten

Inhaltsstoffe:
Gereinigtes Wasser, Macrogolglycerolhydroxystearat, Glycerin 85 %, kühles Minzaroma, Natriumgluconat, Sucralose, Octenidin-HCl, Zitronensäure, Butylhydroxytoluol

Chemisch-physikalische Daten	
Dichte	ca. 1,0 g/cm3 / 20 °C
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	> 100 °C / Methode : ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 4 / 20 °C / (unverdünnt)
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Besondere Hinweise

Anwendungseinschränkungen:
Wegen des Gehalts an Aromen darf das Produkt nicht bei Säuglingen und Kindern unter 3 Jahren angewendet werden. Bei Kleinkindern und Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist, nur nach sorgfältiger klinischer Abklärung einsetzen.
Gegenanzeigen:
Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe darf das Medizinprodukt octenidol® md Mundspüllösung nicht angewendet werden. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem Arzt zu halten.
Nebenwirkungen:
Eventuell auftretende Geschmacksstörungen sind reversibel. In seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden Symptomen wie Brennen und bei gegenüber Menthol empfindlichen Personen zu Übelkeit kommen.
Wechselwirkungen:
Nicht in Kombination mit PVP-Jod anwenden, da dies zu Verfärbungen und Einschränkung der antiseptischen Wirkung des PVP-Jod führen kann.
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
Wenden Sie octenidol® md Mundspüllösung ohne ärztliche Kontrolle nicht über einen längeren Zeitraum ununterbrochen an. Nicht einnehmen. Augenkontakt vermeiden. Nur einwandfreie und unbeschädigte Gebinde verwenden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
octenidol md -INT- 250 ml FL	10/Karton	70000769

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.
Für individuelle Fragen:
Customer Sales Service
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

[1] bzgl. Verfärbung der Zähne: Eine Studie mit 53 Probanden hat gezeigt, dass 94% der Probanden nach 4-wöchiger Anwendung keine Verfärbung aufwiesen. Messverfahren: Vital Skala

Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

Air Liquide HEALTHCARE Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

Hersteller
MPC International S.A.
26, Boulevard Royal
L-2249 Luxembourg

Vertrieb
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

#900952 / 913182-DE-de-05-06 5/2017
Produktinformation wird nicht vom Änderungsdienst erfasst.