zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Sanum

Sanuvis® Tabletten



Darreichungsform:	Tabletten zum Einnehmen
Präparatgruppe:	Präparate aus physiologischen Carbonsäuren
Wirkstoff:	Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12/D30/D200 Potenzakkord
Zusammensetzung:	1 Tablette zu 276 mg enthält: je 50 mg Acidum L(+)-lacticum D4/D6/D12 trit. (HAB, Vorschrift 5a mit gereinigtem Wasser (D1), Vorschrift 7 mit Lactose (D2), Vorschrift 6 mit Lactose (D3-D12)). je 50 mg Acidum L(+)-lacticum D30/D200 trit. (HAB, Vorschrift 5a mit gereinigtem Wasser (D1), mit Ethanol 15% (m/m) (D2), mit Ethanol 43% (m/m) (D3-D25/D3-D195), Vorschrift 7 mit Lactose (D26/D196), Vorschrift 6 mit Lactose (D27-D30/D197-D200)) Sonstige Bestandteile: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	1-3mal täglich 1 Tablette mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen.
Nebenwirkungen:	Keine bekannt.
Gegenanzeigen:	Keine bekannt; siehe Vorsichtsmaßnahmen.
Wechselwirkungen:	Keine bekannt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

	angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Hinweis:	Enthält Lactose.
Zusatzhinweis:	
Warnhinweis:	Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Sanuvis® Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 80 Tabletten, Bündelpackung mit 3x 80 Tabletten.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012