zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Vorbemerkung: Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Retterspitz Innerlich jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

Handelsname, Darreichungsform: Retterspitz Innerlich, Flüssigkeit zum Einnehmen.

Inhaltsstoffe: Citronensäure-Monohydrat, Weinsäure, Aluminiumkaliumsulfat x 12 H_2O, Hühnerei denaturiert, gehärtet, keimfrei, Zitronenöl, Orangenöl, Medizinische Seife, Ethanol, Gereinigtes Wasser, Thymianöl.

Darreichungsform und Inhalt: Retterspitz Innerlich ist in Flaschen mit 350 ml und 1 Liter als einzunehmende Flüssigkeit erhältlich.

Was ist Retterspitz Innerlich und wofür wird es angewendet? Bei Sodbrennen, Reizmagen, Untersäuerung, Übersäuerung, Völlegefühl, Blähungen und Magenschmerzen. Retterspitz Innerlich ist eine Flüssigkeit mit Pufferwirkung zur Herstellung des physiologischen Magenmilieus.

Was müssen Sie vor der Anwendung von Retterspitz Innerlich beachten? Beachten Sie, ob Sie überempfindlich oder allergisch gegen einen Inhaltsstoff von Retterspitz Innerlich sind.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Was müssen Sie bei der Anwendung von Retterspitz Innerlich beachten? Es muss der nach längerem Stehen der Flasche sich ablagernde Bodensatz durch kräftiges Schütteln vor jedem Gebrauch vollständig verteilt werden. Dieser Bodensatz entsteht durch das natürliche, unvermeidliche Zusammenkommen feinster Eiweißflöckchen, er gehört zum normalen Erscheinungsbild des Mittels. Die Flöckchen sind die durch den Herstellungsprozess gehärteten, denaturierten und keimfreien Hilfsstoffe aus Eiweiß und frischem Hühnerei. Dieser Komplex ist grob dispergiert und kolloidal gelöst.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Retterspitz Innerlich: Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn Sie bei Niereninsuffizienz zur renalen Dialyse herangezogen werden. Dann ist eine Daueranwendung zu vermeiden. ***Enthält 2 Vol.-% Alkohol.***

• *Säuglinge und Kleinkinder:* Geben Sie dieses Medizinprodukt an Kinder unter zwei Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

• *Ältere Menschen:* Keine Einschränkung bei älteren Menschen.

• *Schwangerschaft:* Es gibt keine Hinweise dafür, dass durch die Anwendung von Retterspitz Innerlich der normale Verlauf der Schwangerschaft gestört wird, oder dass ein Schaden für das ungeborene Kind entstehen könnte. Im Zweifelsfall fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

• *Stillzeit:* Es gibt keinen Hinweis und keine Erkenntnis, dass durch Anwendungen von Retterspitz Innerlich während der Stillzeit eine Störung auftritt.

• *Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:* Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise: Wichtige Warnhinweise für bestimmte Inhaltsstoffe von Retterspitz Innerlich sind nicht gegeben.

Wie ist Retterspitz Innerlich anzuwenden?

• *Dosierung und Art der Anwendung*

Der in der Flasche abgelagerte Bodensatz wird vor jeder Entnahme kräftig aufgeschüttelt. Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene drei- bis fünfmal täglich ein Likörglas voll (20 ml) Retterspitz Innerlich eine Viertelstunde vor den Mahlzeiten ein. Kinder bekommen ab dem zweiten Lebensjahr drei- bis fünfmal täglich einen Esslöffel voll (15 ml). Retterspitz Innerlich wird unverdünnt eingenommen. Entnommene Flüssigkeit soll nicht in die Originalflasche zurück gegossen werden. Bei chronischer Magen-Darm-Schwäche älterer Personen ist die langfristige, über mehrere Jahre reichende Einnahme angezeigt.

Wenn Sie die Anwendung von Retterspitz Innerlich vergessen haben, wenden Sie die normale Dosis bei nächster Gelegenheit an. Ist es, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, zu einer Überdosierung der empfohlenen Einnahmemenge von Retterspitz Innerlich

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

gekommen, so besteht keine Gefahr. Wurde versehentlich und regelwidrig Retterspitz Innerlich von Kindern getrunken, so besteht keine Gefahr, auch dann nicht, wenn durch den säuerlichen Geschmack eine Art Brechreiz ausgelöst würde.

Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wechselwirkungen und Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Sollten Nebenwirkungen auftreten, so teilen Sie dies bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Wie ist Retterspitz Innerlich aufzubewahren? Retterspitz Innerlich unzugänglich für Kinder aufbewahren. Sie dürfen Retterspitz Innerlich nach dem auf dem Behältnis angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Hinweis auf Anbruch: Anbruchflasche sorgfältig verschlossen bei nicht mehr als +25°C aufbewahren, am besten im Kühlschrank. Der Anbruch soll innerhalb von 12 Wochen aufgebraucht werden.

Aufbewahrungsbedingungen: Nicht über +25°C aufbewahren. Keine besonderen weiteren Anforderungen an die Aufbewahrung.

Sonstige Hinweise: Sollte sich einmal eine Flasche nur schwer öffnen lassen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Tauchen Sie die Flasche mit dem Verschluß nach unten für einige Minuten in ca. 50°C warmes Wasser. Dann sollte sie problemlos zu öffnen sein.

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011


zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

CE
1275

Verwendbar bis: Monat und Jahr

LOT
Chargenbezeichnung

Vor Anwendung Gebrauchsinformation lesen



Lagerbedingungen

Retterspitz® GmbH
Laufer Straße 17–19
D-90571 Schwaig

Telefon 0911 / 507 00 0
Telefax 0911 / 507 00 45
www.retterspitz.de

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011