zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Sanum

Polysan Dx Tropfen



Darreichungsform:	Tropfen zur Diagnostik
Präparatgruppe:	In vitro Diagnosticum
Wirkstoff:	Spengler-Kolloid Dx D9
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml kolloidale Lösung D9 nach Dr. Carl Spengler mit Antigenen von Streptococcus lanceolatus, Staphylococcus aureus, Diplococcus pneumoniae, verstärkt durch Bakterienlysine.
Anwendung:	Zur Diagnostik: Ein Tropfen des zu untersuchenden Blutes wird mit jeweils einem Tropfen der zum Test gewünschten Polysan-Antigene vermengt. Kommt es zu einer Antigen-Antikörper-Reaktion, so findet eine Agglutination statt, die makroskopisch/mikroskopisch sichtbar wird. Der Agglutinationstiter ist gleichzeitig ein Maß für die Höhe des Antikörpertiters.
Nebenwirkungen:	
Gegenanzeigen:	
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	
Vorsichtsmaßnahmen:	
Dauer der Behandlung:	

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Handelsform:	10 ml Tropfflasche.