

Sanum

Fortakehl® D5 Flüssige Verdünnung



Darreichungsform:	Tropfen zum Einnehmen und Einreiben
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) D5
Zusammensetzung:	10 ml enthalten: 10 ml Penicillium roquefortii e volumine mycelii (lyophil., steril.) Dil. D5 (HAB, Vorschrift 5a, Lsg. D1 mit gereinigtem Wasser).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	<p>Zum Einnehmen: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren nehmen 1-2 mal täglich je 5 Tropfen ein.</p> <p>Zum Einreiben: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren reiben einmal täglich 5-10 Tropfen in die Ellenbeuge ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Fortakehl® D5 abgesetzt werden.</p>
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Fortakehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium roquefortii ausgelöst werden.
Gegenanzeigen:	<p>Nicht anwenden bei</p> <p>&#9679; bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium roquefortii)</p> <p>&#9679; Autoimmunerkrankungen</p>

• Kindern unter 12 Jahren

• Schwangeren und Stillenden

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Fortakehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
-------------------	---

Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
---------------------	----------------

Zusatzhinweis:	Penicillium roquefortii ist als Wirkstoff auch in Exmykehl® enthalten.
----------------	--

Dauer der Behandlung:

Handelsform:	10 ml Tropfflasche 10x 10 ml Bündelpackung.
--------------	--

Stand vom:	906
------------	-----
