zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Sanum

Pinikehl® D5 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Fomitopsis pinicola e mycelii (lyophil., steril.) D5
Präparatgruppe:	Pilzpräparat
Wirkstoff:	Fomitopsis pinicola e mycelio D5
Zusammensetzung:	1 ml enthält: 1 ml Fomitopsis pinicola e mycelii (lyophil., steril.) D5 aquos. dil. (HAB, Vorschriften 5b).
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2x wöchentlich 1 Ampulle zu 1,0 ml s.c. injizieren. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Pinikehl® D5 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Pinikehl® D5 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Fomitopsis pinicola (Fichtenporling) • Autoimmunerkrankungen • Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden
Unerwünschte Reaktionen:	
Wechselwirkungen:	Andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die Wirksamkeit von Pinikehl® D5 beeinträchtigen. Vor und nach der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

	ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	1/10/50 Ampullen à 1 ml.
Stand vom:	906

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012