

Pectovowen®

Mischung

Infekte / Abwehr

Pflanzliche Urtinkturen / Potenzen

Bei Erkrankungen der Atemorgane

Wirkstoffe
(10 ml enthalten):**Monographien****Ergänzende Symptomauswahl**

Drosera Dil. D1	0,05 ml	Entzündungen der Atemwege, Keuchhusten	Hustenanfälle, auch nachts, schmerzhaft; zäher Schleim; Schmerz in der Brust
Echinacea purpurea Ø	0,40 ml	Unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen	Entzündungen der Atemwege, Fieber, Frösteln, allgemeines Krankheits- und Schwächegefühl
Kalium iodatum Dil. D4	0,40 ml	Entzündungen der oberen Luftwege	Hartnäckiger, rauher Husten; stechende Schmerzen; reichlicher Auswurf, flüssig bis grünlich; ödematöse Schleimhautschwellung
Lobelia inflata Dil. D4	0,80 ml	Asthma bronchiale, Heuschnupfen	Krampfartiger Husten, erschwertes Atmen, Zusammenschnüren der Brust
Pinus sylvestris Ø	0,30 ml	Entzündungen der Atemwege	Bronchitische Symptome

Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Erkrankungen der Atemwege.

Gegenanzeigen

Pectovowen® darf nicht eingenommen werden von Alkoholkranken sowie bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Pectovowen® außerdem nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen (Leukosen), entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei Schilddrüsenerkrankungen und bei Schwangerschaft und Stillzeit nicht ohne ärztlichen Rat, bei Kindern unter 12 Jahren nicht anwenden..

Nebenwirkungen

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet.

Wechselwirkungen

Keine bekannt.

Hinweis

Enthält 52 Vol.-% Alkohol.

Dosierung

Soweit nicht anders verordnet, **bei akuten Zuständen** alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, je 5–10 Tropfen, **bei chronischen Verlaufsformen** 1–3 x täglich 5–10 Tropfen einnehmen. **Dauer der Anwendung:** Pectovowen® sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 Wochen eingenommen werden.

Packungsgröße

50 ml Mischung