zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Sanum

Ginkgobakehl® D4 Flüssige Verdünnung zur Injektion



Darreichungsform:	Flüssige Verdünnung zur Injektion
Wirkstoff:	Ginkgo biloba e foliis sicc. D4
Zusammensetzung:	2 ml enthalten: 2 ml Ginkgo biloba e foliis sicc. D4 dil. (HAB, Vorschrift 4a mit Ethanol 62% (m/m), 11). Sonstige Bestandteile: Wasser für Injektionszwecke, Ethanol, Natriumchlorid.
In der Naturheilkunde dokumentierte Anwendungsgebiete:	Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild
Anwendung:	Täglich 2 ml i.m., i.v., s.c. oder i.c. injizieren.
Nebenwirkungen:	Sehr selten leichte Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen oder allergische Hautreaktionen. Darüber hinaus wurde bei Langzeitanwendungen über Einzelfälle von Blutungen berichtet, deren ursächlicher Zusammenhang mit der Einnahme von Ginkgo-Zubereitungen nicht gesichert ist. Beim Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Arzneimittel abgesetzt werden und ein Arzt befragt werden.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Ginkgo biloba.
Wechselwirkungen:	Die Wirkung von gerinnungshemmenden Arzneimitteln kann verstärkt werden. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch gelten können, wenn die Einnahme wenige Stunden oder Tage zurückliegt.
Vorsichtsmaßnahmen:	Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

	angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	1/10/50 Ampullen à 2 ml.
Stand vom:	008

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Juli 2012