
zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info



Poikiven® Mischung

Combustin®

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum/ Arnica montana/ Silybum marianum/ Hamamelis virginiana/ Lachesis mutus/ Lycopodium clavatum/ Melilotus offcinalis.
Zur Anwendung bei Kindern ab 12 Jahren und Erwachsenen.

Lesen Sie bitte die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn Sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Poikiven jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Poikiven und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Poikiven beachten?
3. Wie ist Poikiven anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Poikiven aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. Was ist Poikiven und wofür wird es angewendet?

Poikiven ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Gefäßsystems.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Beschwerden bei Krampfaderleiden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Poikiven beachten?

Poikiven darf nicht eingenommen werden
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe von Poikiven sind.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Korbblütler sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Poikiven ist erforderlich
Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bei bläulicher Verfärbung der Beine ist eine sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Weitere vom Arzt verordnete nicht invasive Maßnahmen, wie z. B. Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wasserergüsse, sollten unbedingt eingehalten werden.

Bei Einnahme von Poikiven mit anderen Arzneimitteln
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen von Poikiven mit anderen Arzneimitteln wurden bisher nicht beobachtet.

Bei Einnahme von Poikiven zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Poikiven in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Ein Einfluss von Poikiven auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurde bisher nicht beobachtet.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Poikiven
Dieses Arzneimittel enthält 60 Vol.-% Alkohol.

Hinweis
Zumindest zu Beginn der Therapie von Krampfaderleiden sollte an die zusätzliche Verwendung von Kompressionsverbänden bzw. Stützstrümpfen gedacht werden.

3. Wie ist Poikiven einzunehmen?

Nehmen Sie Poikiven immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Kinder über 12 Jahre nehmen 1 – 3 mal täglich je 5 Tropfen Poikiven ein.
Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Art der Anwendung
Die Mischung wird verdünnt in lauwarmem Wasser eingenommen.

Dauer der Anwendung
Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über eine längere Zeit angewendet werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Poikiven zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Poikiven eingenommen haben, als Sie sollten
Besondere Maßnahmen sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht erforderlich.

Wenn Sie die Einnahme von Poikiven vergessen haben
Grundsätzlich sollen Arzneimittel nach Verordnung des Arztes eingenommen werden. Bitte gleichen Sie vergessene Einnahmen nicht durch Verdopplung der Dosierung aus, sondern führen Sie in diesen Fällen die Einnahme wie ursprünglich vorgesehen fort.

Wenn Sie die Einnahme von Poikiven abbrechen
Bitte wenden Sie sich vorher an Ihren Arzt oder Apotheker, dieser kann eventuelle Auswirkungen auf Ihr Befinden am besten beurteilen.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Poikiven Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	*mehr als 1 von 10 Behandelten*
Häufig:	*kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen*
Gelegentlich:	*kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen*
Selten:	*kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen*
Sehr selten:	*kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen*
Nicht bekannt:	*Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar*

Mögliche Nebenwirkungen
Gelegentlich können Völlegefühl und Übelkeit auftreten, wenn die Einnahme vor den Mahlzeiten erfolgt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Poikiven aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Packung und dem Flaschenetikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Bei allen Präparaten aus Naturstoffen können bei der Lagerung Trübungen auftreten.

Aufbewahrungsbedingungen
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Entsorgung
Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. Weitere Informationen

Was Poikiven enthält
10 g [entsprechend 10,87 ml] der Mischung enthalten die Wirkstoffe:

Aesculus hippocastanum	Dil. D1	2,429 g
Arnica montana	Ø	0,454 g
Silybum marianum	Dil. D1	1,008 g
Hamamelis virginiana	Dil. D1	1,939 g
Lachesis mutus	Dil. D6	1,334 g
Lycopodium clavatum	Dil. D4	0,901 g
Melilotus officinalis	Dil. D3	1,935 g

1 ml der Mischung entspricht 34 Tropfen.

Wie Poikiven aussieht und Inhalt der Packung

Die Flüssigkeit ist klar und braungelb gefärbt.

Originalpackung enthält 50 ml der Mischung.

Pharmazeutischer Unternehmer
COMBUSTIN
pharmazeutische Präparate GmbH
Offinger Str. 7
D-88525 Hailtingen

Hersteller und Endfreigabe
LOMAPHARM
Rudolf Lohmann GmbH KG
Langes Feld 5
D-31860 Emmerthal

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2016

Aktualisierungsstand Gebrauchs.info Februar 2017