Renavit

B-Komplex plus C
wasserlösliche Vitamine

Ergänzende bilanzierte Diät zur besonderen Ernährung bei Niereninsuffizienz

Datenblatt

Handelsform: 100 überzogene Tabletten
PZN: 0373159 5

Zusammensetzung
pro Tablette (1 überzogene Tablette = 0,45 g)

Vitamin B1	3,0 mg
Vitamin B2	1,7 mg
Vitamin B6	10,0 mg
Vitamin B12	6,0 µg
Vitamin C	120,0 mg
Biotin	300,0 µg
Folsäure	1,0 mg
Nicotinamid	20,0 mg
Pantothensäure	10,0 mg

Nährwerte	pro Tablette	pro 100 g
Energie	0,89 kcal	198 kcal
	3,82 kJ	848 kJ
Eiweiß	<2,25 mg	< 0,50 g
Kohlenhydrate	99,00 mg	22,00 g
davon Zucker	*99,00 mg*	*22,00 g*
Fett	99,00 mg	1,4 g
davon gesättigte FS	*5,90 mg*	*1,3 g*
Salz	0,09 mg	0,02 g

BE: 3,0 / 100 g bzw. 0,01 / überzogene Tablette

Zutaten (Mengenangaben pro 100 g)**:**
Vitamine: 28,5 g Ascorbinsäure (Vitamin C), 4,7 g Nicotinamid, 2,8 g Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 2,4g Calciumpantothenat, 747 mg Thiaminnitrat (Vitamin B1), 396 mg Riboflavin (Vitamin B2), 233 mg Folsäure, 70 mg Biotin, 0,002 mg Cyanocobalamin (Vitamin B12). Saccharose, Talkum, Laktose, Pulvercellulose, Farbstoff: Titanoxid, Siliciumdioxid, Gummi arabicum, Polyvenylpyrrolidon, Glycosesirup, Magnesiumstearat, Calciumcarbonat, Pflanzliches Fett (gehärtet), Aluminiumsilikat, Gelatine, Hydroxypropylmethylcellulose, Maisstärke, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Farbstoff: Cochenillerot A, mikrokristalline Cellulose, Speisefettsäure, Sonnenblumenöl, Carnauba-Wachs.

Wichtige Hinweise
Renavit ist kein vollständiges Lebensmittel und daher nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden.

Lagerung
Trocken, vor Licht geschützt und nicht über Raum-Temperatur (25°C) lagern.

Anwendungsgebiete
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät nach EG-Richtlinie 1999/21/EG) zur Behandlung von ernährungsbedingten / dialysebedingten Vitaminmangelzuständen und eines erhöhten Homocysteinspiegels.

Verzehrsempfehlung
Im Allgemeinen täglich 1 überzogene Tablette, nach Anweisung des Arztes, unzerkaut schlucken.

Hinweise
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz kommt es häufig zu einem Mangel an wasserlöslichen Vitaminen
- aufgrund einer verminderten Zufuhr von wasserlöslichen Vitaminen durch diätetische Einschränkung (Milch, Obst, Gemüse, Fleisch, Brot) und / oder Wässerung kaliumreicher Nahrungsmittel (Kartoffeln), die gleichzeitig wertvolle Vitaminträger sind,
- durch Verluste wasserlöslicher und damit dialysabler Vitamine durch die Dialysebehandlung,
- durch urämiebedingte Störungen im Vitamin-Stoffwechsel.

Renavit enthält alle empfohlenen wasserlöslichen Vitamine. Seine Zusammensetzung senkt die bei Dialysepatienten erhöhten Homocystein-Spiegel. Zudem wird der EPO-Verbrauch optimiert.

Fettlösliche Vitamine (Vitamin A, D, E, K) sind nicht enthalten, da bei Niereninsuffizienz im Allgemeinen kein zusätzlicher Bedarf besteht. Darüber hinaus ist die Gefahr toxischer Anreicherung fettlöslicher Vitamine (insbesondere Vitamin A) bei eingeschränkter Nierenfunktion, aufgrund hoher Speicher-Kapazität des Körpers und gestörtem Stoffwechsel sowie verminderter Ausscheidung, gegeben.

Stand: 11-2014

Post
RenaCare NephroMed GmbH
Werrastr. 1a
35625 Hüttenberg
Germany

Kommunikation
☎ 06403-92160
Fax 06403-92163
e-Mail: **mail@renacare.com**

Registrierung
AG Wetzlar HRB - 1728
Ust-ID-Nr: DE 811 779 226
Geschäftsführer
Lisa Lesch,
Dr. med. Katharina Bartz